

BİOLOGİYA

UOT 581.9

SAMUR – ŞABRAN OVALIĞI YARIMSƏHRA BİTKİLİYİNİN
MƏHSULDARLIĞI, QİDALILIĞI VƏ TUTUMUNUN
MÜƏYYƏN OLUNMASI HAQQINDA

E.M.QURBANOV, H.Z.HÜSEYNOVA

*Bakı Dövlət Universiteti**elshad_g@rambler.ru*

Respublikamızda dövlət torpaq fonduna aid olan yay və qış otlaqları köçəri heyvandarlığın inkişafı üçün təbii yem mənbəyi kimi istifadə edilir. Belə otlaqlarda fitosenoloji tədqiqatların aparılması ən aktual problemlərdən biridir. Aparılan tədqiqatın başlıca məqsədi ovalıqda yerləşən yarımşəhra bitkiliyində yovşanlı-efemerlik formasiyasının məhsuldarlığı, qidalılığı və tutumunu araşdırmaqdır.

Ölkə Prezidentinin 22 may 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənmiş «Azərbaycan Respublikasında yay-qış otlaqlarının, biçənlərin səmərəli istifadəsi və səhrələşmənin qarşısının alınmasına dair Dövlət Proqramı»nda otlaqların yaxşılaşdırılması üçün geobotaniki tədqiqatlardan istifadə edilməsi qarşıya qoyulmuşdur.

Acar sözlər: fotosintez, formasiya, dominant, fitosenologiya, protein.

Ovalığın yarımşəhra bitkiliyində (Şabran və Xızı rayonları ərazisindəki qış otlaqlarında) 2009-2010-cu illərdə apardığımız fitosenoloji, yaxud geobotaniki tədqiqatlarda yovşanlı-efemerlik formasiyasına dair növ tərkibi, quruluşu, məhsuldarlığı, yem keyfiyyəti (qidalılığı) və tutumu aşkar edilmişdir. Bu formasianın bitki örtüyündən toplanmış herbarilər sistemləşdirilməklə təyin edilmişdir [1, 11, 12].

Müəyyən olunmuşdur ki, həmin fitosenozun quru otda yeyilən hissəsinin məhsuldarlığı yazda (aprel-may) 4,4 s/ha, payız (noyabr-dekabr) mövsümündə 3,7 s/ha; Orta illik məhsuldarlıq isə 8,1 s/ha təşkil edir (cədvəl 3).

Azərbaycanda yovşanlı-efemerlik formasiyası barədə Y.M.İsayev [4], L.İ.Prilipko [8], R.K.Məlikov [4], S.Z.Əliyev [2], Ə.İ.Mayılov, V.V.Hətəmov [7, 3], E.M.Qurbanov [6] və başqalarının əsərlərində məlumatlar əks olunur. Lakin müvafiq əsərlərdə Samur-Şabran ovalığında bu formasianın fitosenoloji xüsusiyyətləri, eləcə də məhsuldarlığı, qidalılığı və tutumuna dair

göstəricilərə rast gəlinmir.

Buna görə də ilk dəfə olaraq bizim tərəfimizdən aparılan tədqiqatın obyektlərindən biri də Şabran rayonu ərazisində yerləşən 4 saylı qış otlığında yayılan yovşanlı-efemerlik yarımşəhra formasıyasının məhsuldarlığı səciyyəvi ot örtüyündən biçim üslu ilə 3 dəfə təkrarla 1 m² sahədən yazda taxılottarı, paxlalı otlar və payızda müxtəlif otlar (yaş və quru çəkiddə) təyin edilmişdir [1]. Həmçinin formasıyanın növ tərkibində qeydə alınan əsas yem bitkilərinin biokimyəvi analizləri V.A.Razumovun [9] metodikasına əsasən aparılmışdır. O cümlədən, analizin nəticələri üzrə azotsuz ekstraktiv maddələr (AEM), yem vahidi və mənimsənilən protein hesablanmışdır [1].

Tədqiqat obyekti Xəzər dənizinin 3,5-4 km məsafəsində formalaşan Liman gölü, «Ovçluq təsərrüfatı», Qaradəhnə arxı və bələdiyyə torpaqları ilə əhatə olunur. Buranın relyefi dalğavari düzəndir. Dəniz səthindən hündürlüyü – 28 metrədən 35 metrə çatır (relyefində «baş kollektor, bataqlıq və çökəkliklər» təsadüf edilir). Qeydə alınmış yovşanlı-efemerlik fitosenozu 4 saylı qış otluqlarının hüdudunda boz-çəmən torpaqlarda inkişaf etmişdir.

Ərazinin yerləşdiyi Şabran rayonuna xas iqlimi yayı quraq keçən mülayim isti yarımşəhra və quru çöl tipinə mənsubdur (bitki örtüyünün məhsuldarlığına və s. bilavasitə təsir göstərir). Havanın orta illik temperaturu 12,5⁰C; yağıntının miqdarı 308 mm-ə bərabərdir.

Şabran rayonu ərazisindəki Quba rayonuna təhkim edilmiş qış otluqlarının ümumi sahəsi 190,0 hektardır (cədvəl 2). Bundan 381,7 ha (32,1%) yovşanlı-efemerlik formasıyasına aiddir. Qalan 808,3 ha (67,9%) qumluq, qamışlı-bataqlıq və yararsız torpaqlardır. Lakin 2 saylı cədvəldən görüldüyü kimi cığlı-gəcəli yovşanlıq 92,5 ha (7,8%) və qamışlı-ayrıqlı-cığlıq 98,6 ha (8,4%) qumsal və bataqlı torpaqlarda yayılır (hər iki formasıya yem əhəmiyyəti aşağı olması səbəbinə görə fitosenoloji və s. xüsusiyyətləri şərh olunmur).

Bitki örtüyünün növ tərkibi və fitosenoloji quruluşunun təhlilinə görə yovşanlı-efemerlikdə təsvir edilən cəmi 24 növdən 1 növ (4,2%) kol, 1 növ (4,2%) yarımqollar, 7 növ (29,2%) çoxillik otlar, 7 növ (29,%) birillik otlar və 8 növ (33,3%) efemerlərdir. Bunlardan 19 növ (79,2%) yem, 5 növ (20,8%) zərərli və zəhərli bitkilərdir.

Bu formasıyanın dominantı ətirli yovşan (*Artemisia lerchiana* Web.) bolluğu 3-4 bal, subdominantları şərq bozağı (*Eremopyrum orientale* (L.) Nevski.), Yapon tonqalotu (*Bromus japonicus* Thunb.) bolluğu 2-3 və 2 balla qeydə alınmışdır. Fitosenozun layihə (proektiv) örtüyü 60-80%-ə uyğundur.

Formasıyanın botaniki qruplar üzrə məhsuldarlığı və yem vahidi, eləcə də fitosenozun istifadə müddəti və davarın gündəlik yem normasının 1,3 yem vahidi qəbul olunması qış otlaq sahəsinin hektarda yükünü və cəmi yararlı sahədə isə tutumunu müəyyənləşdirilməyə imkan verir (cədvəl 4).

Cədvəl 4-dən görüldüyü kimi yovşanlı-efemerlik formasıyasının biokimyəvi analizlərinin nəticələrinə görə xam proteinin miqdarı 8,9%, sellüloza isə 25,9% olmuşdur.

Əlavə edək ki, bu formasiya üzrə otlığın yükü hektada 1.5 davara uyğundur [3]. Qənaətə gəlirik ki, Şabran rayonu ərazisindəki Quba rayonunun 4 saylı qışlağında – 189,6 hektarda 304 baş olavar bəslənməsi mümkündür.

Cədvəl 1

**Şabran rayonu ərazisində Quba rayonunun 4 saylı qış otlığında, yovşanlı-efemerlik formasiyasının növ tərkibi və quruluşu (Artemisia lerchiana Web. dominantlığı ilə), (Relyefi-düzən, torpağı boz-çəmən),
10 may 2010-cu il**

Nö	Növlərin adı	Bolluğu (balla)	Mərtəbəlilik və hündürlük (sm-ə)	Fenoloji fazalar
1	2	3	4	5
Kollar				
1.	Salsola dendroides (C.A.Mey.) Mog.	1	I (80)	veq.
Yarımkollar				
2.	Salsola dendroides Pall.	1	II (60)	veq.
Çoxillik otlar				
3.	Artemisia lerchiana Web.	2	III (30)	veq.
4.	Poa bulbasa L.	1-2	III (10)	çiç.
5.	Limonium caspica (Willd.) Gams.	1	II (40)	veq.
6.	Glycyrrhiza glabra L.	1	III (30)	veq.
7.	Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Fisch.	1	III (20)	veq.
8.	Plantago lanceolata L.	1	III (10)	çiç.
9.	Cynodon dacty len (L.) Pers.	1	III (5)	çiç.
Birillik otlar				
10.	Petrosimonia brachiata Pall. (Bunge.)	1-2	III (25)	veq.
11.	Chenopodium album L.	1-2	III (15)	veq.
12.	Phalaris minor Retz.	1-2	III (10)	çiç.
13.	Erodium cicutarium (L.) L.Her.	1-2	III (5)	çiç.
14.	Xanthium strumarium L.	1	II (35)	çiç.
15.	Filago pyramidata L.	1	III (10)	çiç.
16.	Ceimacaptera crassa (Bieb.) Botsch.	1	III (5)	veq.
Efemerlər				
17.	Ezempyrum orientale (L.) Nevski.	2-3	III (20)	çiç.
18.	Bromus japonicus Thunb.	2	III (25)	çiç.
19.	Avena eriantha Duren.	1-2	III (15)	çiç.
20.	Anisantha rubens (L.) Nevski.	1-2	III (30)	çiç.
21.	Lolium rigidum Gaudin.	1	III (20)	çiç.
22.	Hordeum leporinum Link.	1	III (15)	çiç.
23.	Medicago minima (L.) Bartabini	1	III (10)	paxeo.tök.
24.	Allium rubellum Bieb.	1	III (5)	çiç.

Layihə örtüyü 60-80%

Cədvəl 2

Şabran rayonu ərazisində 4 və 5 №-li qış otlaqlarının formasiyalar üzrə sahələri

Otlaq №	Formasiyalar	Otlığın növü	Sahəsi	
			ha	%
4	Yovşanlı-efemerlik	təmiz	189,6	15,9
5	Cığlı-gəcəli yovşanlıq	qumsal	92,5	7,8
3	Qamışlı-ayrıqlı-cığlıq	bataqlıq	99,6	8,4
	Tədqiq olunan sahələr		381,7	32,1
	Tədqiq olunmayan sahələr		808,3	67,9
	Ümumi sahə		1190,0	100,0

Boz-çəmən torpaqda yayılan yovşanlı-efemerlik formasiasının botaniki qruplar üzrə məhsuldarlığı (4№-li «Sarvan-nohur» qış otlaq sahəsi), 15.XI.2009-10.V.2010-cu il

Bitki ot qrupları	Yeyilən quru kütlə			
	Yaz		Payız	
	s/ha	%	s/ha	%
Taxıl otlar	2,8	34,6	-	-
Paxlalı otlar	1,6	19,7	-	-
Müxtəlif otlar	-	-	3,7	45,7
Cəmi:	4,4	54,3	3,7	45,7
Orta məhsuldarlıq	8,1			

Yovşanlı-efemerlik formasiasının qidalılığı, məhsuldarlığı, yem keyfiyyəti və otlaq tutumu üzrə göstəricilər

Hidrooskopik nəmlik	Mütləq quru maddədə, %-lə					100 kq yemdə		Məhsuldarlıq, s/ha	İstifadə müddəti	Otlağın		
	Xam kül	Xam protein	Xam yağ	Xam selüloza	AME	Yem vahidi	mənimənilə n protein			sahəsi (ha-la)	yükü	tutumu
12,5	7,2	8,9	2,9	25,9	42,6	52,7	4,2	8,1	210	189,6	1,6	304

Aparılan geobotaniki tədqiqatların nəticələri göstərir ki, yovşanlı-efemerlik formasiasının məhsuldarlığı əvvəlki illərə nisbətən aşağı düşmüş, yem keyfiyyəti pisləmiş, fitosenozun növ tərkibi kasıblaşmış və deqradasiyaya məruz qalmışdır. Buna görə də müvafiq formasiasının ot örtüyündən səmərəli istifadəsi və yaxşılaşdırılması üçün aşağıdakı tövsiyələrin həyata keçirilməsini məqsəduyğun hesab edirik:

- Otlaq sahəsinin elmi-praktiki əsaslarla düzgün, yaxud səmərəli istifadəsi üçün ilk növbədə otlağın yovşanlı-efemerlik bitki örtüyündə güzlə otarmanın təşkili;

- Seyrəkləşən fitosenozda səthi şorlaşmış torpaqlarda əsaslı yaxşılaşdırma tədbirlərinin tətbiqi;

- Burada rast gəlinən zərərli, zəhərli və alaq bitkilərini çiçəkləmədən əvvəl mexaniki və bioloji üsulla məhv etməli;

- Yaxşılaşdırılan sahələrə ətirli yovşan, sivrım əzgən, mavi qarayonca, sürünən ayriq və s. kserofit yem bitkilərini payızda ilk yağmurdan sonra hər hektara 1-5 kq səpməli və s. mədəni-texniki tədbirlər yerinə yetirməli;

- Ot örtüyünün bərpası üçün hektara 5-10 ton üzvi gübrə (peyin), azot gübrəsi 1-2 s/ha və fosfor gübrəsi - 4 s/ha verilməsi;

- Torpağın su-hava rejiminin nizamlanması;

- Otlaqdan səmərəli istifadəsi üçün növbəli otarmaya riayət olunması və

dincə buraxılması, optimal otarma müddətinə əməl olunması.

Öncə qeyd edilən tədbirlər yerinə yetirilərsə, Şabran rayonu ərazisindəki qış otluqlarının məhsuldarlığı yüksələcək və tutumu çoxalacaq. Bu da öz növbəsində bitki örtüyünün mühafizəsinə əməl olunması deməkdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasının təbii yem sahələrinin irimiqdarlı geobotaniki tədqiqatına dair təlimat. Bakı: Maarif, 2002, 144 s.
2. Əliyev S.Z., Quliyev Ş.M., Səttarov C.X. və b. müəlifliyi ilə. Qobustan qış otluqlarının əsas yem bitkilərinin keyfiyyət göstəriciləri və otluqlardan səmərəli istifadə // Azərbaycan Aqrar elmi jurnal, Bakı, 1997, s.37-39.
3. Hətəmov V.V. Azərbaycanın otluq ekosistemləri və qorunması. Bakı: Elm, 2000, 184 s.
4. Məlikov R.K. Şirvanın yarımsəhra fitosenozlarının bəzi dominant növlərinin kimyəvi tərkibi və qidalılıığı /AMEA-nın Xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası, 1984, №1, s.22-26.
5. Исаев Я.М. Растительность зимних пастбищ Азербайджана, её кормовое значение: Автореф. дис. доктор. биол. наук. Баку, 1957, 35 с.
6. Гурбанов Э.М. Флора и растительность Антропатенской провинции (в пределах Азербайджанской Республики): Автореф. дисс. на соиск. учен. степени докт. биол. наук. Баку, 2004, 59 с.
7. Маилов А.И., Атамов В.В. Кормовая ценность и ёмкость типов пастбищ Азербайджана // Докл. АН Азерб. ССР, т.40, №2, 1984, с.65-69.
8. Прилипко Л.И. Растительный покров Азербайджана. Баку: Элм, 1970, 170 с.
9. Разумов В.А. Справочник лаборанта-химика по анализу кормов. М.: Росселхозиздат, 1986, 302 с.
10. Томля М.Ф. Корма СССР (Состав и Питательность). М.: Колос, 1964, 448 с.
11. Флора Азербайджана. Баку: АН Азерб. ССР, тт. I-VIII, 1950-1961.
12. Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. Л.: Наука, 1981, 512 с.

OB УТОЧНЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ, ПИТАТЕЛЬНОСТИ И ЁМКОСТИ ПОЛУПУСТЫННЫХ РАСТИТЕЛЬНОСТЕЙ САМУР-ШАБРАНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Э.М.ГУРБАНОВ, Х.З.ГУСЕЙНОВА

РЕЗЮМЕ

Для развития животноводства, в частности, овцеводства, большое значение имеет рациональное использование и улучшение зимних пастбищ на территории полупустынной растительности. В связи с чем целесообразно использование результатов фитоценологического исследования.

Одним из объектов исследования была территория зимних пастбищ Губинского района на территории Шабранского района.

В результате исследований выявлены три основных формаций, которые только характеризуются полынно-эфемеровой формацией; их состав, структура и урожайности.

В статье приводятся результаты биохимического анализа полынно-эфемеровых сообществ полупустынной растительности Самур-Шабранской низменности. Даны мероприятия по рациональному использованию и улучшению растительности Самур-Шабранской низменности.

Ключевые слова: фотосинтез, формация, доминант, фитоценология, протеин

**SPECIFICATION OF PRODUCTIVITY, NUTRITIOUSNESS
AND CAPACITY OF SEMI-DESERTIC VEGETATION
OF SAMUR-SHABRAN LOWLAND**

E.M.GURBANOV, H.Z.HUSEYNOVA

SUMMARY

For the development of livestock sector, sheep breeding in particular, the rational use and improvement of winter pastures in the territories of semi-desertic vegetation are of notable importance, which necessitates the use of results of fitocenological researches.

The territory of winter pastures of Guba region in Shabran area is one of the objects of the research.

As a result of the research three basic formations; composition, structure and productivity which are only characterized by wormwood-ephemera formation are revealed.

The article concludes the results of the biochemical analysis of wormwood-ephemera communities of semi-desertic vegetation of Samur-Shabran lowland. The authors provide offers for rational use and improvement of vegetation of Samur-Shabran lowland.

Key words: photosynthesis, formation, dominant, protein

Redaksiyaya daxil olub: 10.03.2011-ci il.

Çapa verilib: 27.05.2011-ci il.