

UOT 550.8:553.3/9

**SARIBAŞ STRUKTUR-FORMASIYA ZONASINDA APARILACAQ
GEOLOJİ-KƏŞFİYYAT İŞLƏRİNİN PRIORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ****E.F.QƏNBƏROVA***Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi**E.Qenberova@mail.ru*

Məqalədə Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən Sarıbaş struktur formasiya zonasının geoloji öyrənilməsinin icmalı verilmişdir. Sarıbaş struktur formasiya zonasının yanaşı strukturlarla müqayisədə Böyük Qafqazın cənub yamacındakı mövqeyi və geoloji quruluşu şərh edilmişdir.

Mövcud məlumatların təhlilinin nəticəsi olaraq Sarıbaş struktur formasiya zonasında gələcəkdə aparılması vacib hesab edilən geoloji-kəşfiyyat işləri və onların əsaslandırılması öz əksini tapmışdır.

Açar sözlər: Sarıbaş, formasiya zonası, kolçedan-polimetal, mis-kolçedan, pirit, xalkopirit, sfalerit, markazit, qalenit, maqnetit, hematit, ilmenit, rulit və s.

Sarıbaş struktur formasiya zonası mövqeyinə görə Balakən-Zaqatala filiz rayonunu hüdudlandırır. Bu rayonun filizliliyi haqqında ilkin məlumat 1865-ci ildə Q.Abix tərəfindən verilmişdir. 1902-1906-cı illərdə K.N.Boqdanoviç uyğun olaraq “iki kəsiliş” və “Dibrar sistemi” monoqrafiyalarını nəşr etdirmiş və ilk dəfə olaraq rayonda təşəkkül tapmış Mezozoy çöküntülərinin təsnifatını vermişdir.

1913-1914-cü illərdə professor V. Nikitinin rəhbərliyi altında alman firması “Vaqau” Cıxış yatağında kəşfiyyat işləri aparmışdır.

1945-1947-ci illərdə Ə. Şıxəlilərli (10) ilk dəfə bütün rayonda yayılmış Yura və Təbaşir çöküntülərinin dəqiq stratigrafik bölgüsünü tərtib etmiş, rayonun tektonikası və maqmatizmi haqqında geniş şərh vermişdir. Ən planlı və səmərəli iş 1956-cı ildən başlayaraq Azərbaycan Geologiya İdarəsi tərəfindən aparılmışdır.

1956-1959-cu illərdə Balakən-Zaqatala rayonunun əksər hissəsində B.İsayev, T.Nəsibov tərəfindən 1:50000 miqyaslı xəritəalma işləri aparılmış və Ə.Şıxəlilərlinin 1945-1947-ci illərdə apardığı geoloji işlərin nəticələri bir daha təsdiq olunmuşdur.

1956-1959-cu illərdə aparılan sahəvi geofiziki işlər (Ə.Nəbiyev) nəticəsində bir sıra perspektivli anomal sahələr və polimetalların səpinti oreolları

aşkar edilmişdir.

1958-1959-cu illərdə (S.İsmayılov, T.Məmmədov, A.Cəfərov və E.Yeqanov) Balakənçay hövzəsində 1:100000 miqyaslı axtarış işləri aparmışlar. Nəticədə Filizçay kimi stratiform tipli unikal polimetal yatağının massiv filiz çıxışı aşkar edilmişdir.

Filizçay kolçedan-polimetal yatağının açılması bölgədə axtarış və kəşfiyyat işlərinə böyük təkan vermişdir. Geofiziki, geokimyəvi tədqiqatların müəyyənləşdirilməsi ilə 1:200000, 1:50000 və daha irimiqyaslı geoloji xəritələr tərtib edilmiş və müxtəlif vaxtlarda Katex (1962-1964-cü illər R.Əliyev, N.Musayev), Kasdağ, Saqator (1977-ci il N.Musayev, A.Şirinov) kimi yataqlar və bir sıra filiz təzahürləri aşkar edilmişdir.

Mazımçay sahəsində bir sıra geofiziki və geokimyəvi anomaliyalar müəyyənləşdirilmişdir (R.Hüseynov. Mazımçay geoloji-geokimyəvi partiyası – 1963-cü il).

Kasdağ sahəsində müəyyən edilmiş geofiziki anomaliyaların (1962-1963-cü illərdə S.Muradxanov, B.Alekseyev) təbiətini öyrənmək məqsədilə 1964-cü ildə aparılan axtarış işləri (V.Nağıyev, İ.Nesterov) nəticəsində 5 filiz zonası aşkar edilmişdir. 1983-cü ildə sənaye əhəmiyyətli ehtiyatları sabiq SSSR Nazirlər Soveti yanında DEK-da təsdiq olunmuş ən perspektivli hesab edilən I zonada uzun müddət geoloji-kəşfiyyat işləri aparılmışdır. 1981-99-cu illərdə bu sahədə V filiz zonasında, bir sıra axtarış və axtarış-qiymətləndirmə işləri aparılmış və daha dəqiq nəticələrin alınması məqsədilə kəşfiyyat işlərinin aparılması tövsiyə edilmişdir. Yanaşı olaraq II və başqa xırda zonaların perspektivliyi qiymətləndirilmişdir (1981-84-cü illər N.Eyyub, F.Abdullayev).

1973-77-ci illərdə N.Qurbanov, V.Romanov və s. tərəfindən Balakən-Zaqatala rayonunun filizli çöküntülərinin litoloji-struktur xüsusiyyətləri öyrənilmiş 1:25000 miqyaslı litoloji-struktur xəritəsi tərtib edilmişdir.

1976-80-ci illərdə Ə.Məmmədov və başqaları tərəfindən Balakən-Zaqatala filiz-rayonu ərazisində 1:500000 miqyaslı axtarış planalma işləri aparılarkən ərazinin geoloji quruluşu dəqiqləşdirilmiş, Alt və Orta Yura süxurlarının mis və polimetal, Üst Yura süxurlarının isə manqana perspektivliyi müəyyən edilmişdir.

1950-ci illərdən başlayaraq Ə.Şıxəlibəyli, M.Qaşqay, R.Abdullayev, H.Kərimov tərəfindən Böyük Qafqazın cənub yamacının tektonikası, maqmatizmi, geokimyəsi və çoxillik tədqiqatlar nəticəsində Balakən-Şəki metallogenik əyaləti ayrılmış və mis-polimetal yataqlarının əmələ gəlməsi və formalaşması üçün əsas amillər sayılan stratigrafik, litoloji-struktur və maqmatik əlamətlər kompleksi müəyyənləşdirilmişdir.

1991-97-ci illərdə F.H.Sərkərov (9) tərəfindən Sarıbaş filiz sahəsində mis-kolçedan və mis-polimetal filizlərinə axtarış işləri aparılmış, nəticədə iki filizləşmə zonası üzrə proqnoz ehtiyatları hesablanmışdır.

Bu vaxta qədər aparılan işlər ərazinin geoloji quruluşunun müəyyən dərəcədə aydınlaşdırılmasına və müxtəlif perspektivli, filiz saxlayan süxur və strukturlar haqda fikir söyləməyə imkan verir.

Böyük Qafqazın Alp qırıxıqlıq qurşağı regionun müasir strukturunda ümumqafqaz istiqamətində 1000 km məsafəyə qədər uzanaraq mürəkkəb geoloji quruluşu və zəngin filizliliyi ilə əhəmiyyətli mövqeyə malikdir.

Strukturun əsas tərkib hissələrindən olan cənub yamacında (şimaldan cənuba doğru) fərqli geoloji-struktur, metallogenik, maqmatik, litoloji xüsusiyyətlərə malik Tufan, Sarıbaş, Zaqatala-Qovdağ, Duruca və Vəndam struktur formasiya zonaları ayrılır. Bu struktur formasiya zonaları bir-biri ilə Baş Qafqaz, Köhnəmədən, Sarıbaş, Məlkəməud, Zəngi, Qaynar dərinlik qırılmaları ilə sərhədlənir.

Qeyd edilən struktur komplekslər antiqafqaz istiqamətli iri eninə qırılmalarla doğranaraq, pilləli qalxma, enmə, üstəgəlmə və s. tipli bloklar yaradırlar.

Sarıbaş struktur formasiya zonasının geoloji quruluşu əhəmiyyətli dərəcədə digər yanaşı struktur formasiya zonalarından fərqlənir. Geniş sinklinori olan Sarıbaş pilləsi, başlıca olaraq onunla fərqlənir ki, nisbətən yüksək dərəcəli qırıxıqlıqlar və çoxlu miqdarda qırılmalar onun quruluşunu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişlər. Təsvir etdiyimiz pilləni fərqləndirən ikinci xüsusiyyət, bu zona hüdudlarında intruziv maqmatizmin cüzi olmasıdır.

Sarıbaş pilləsini o biri pillələrdən fərqləndirən üçüncü əhəmiyyətli fərqi üst aalen terrigen, çökmə süxurların az dərəcədə dislokasiya olunması ilə əlaqədar olan disharmonik qırıxıqlıqların olmasıdır. Dislokasiya xarakterinə, terrigen süxurların yaşına və strukturların morfoloji tiplərinə görə Sarıbaş pilləsi (zonası) iki paralel yaxın, uzununa ikinci dərəcəli tektonik pillələrə ayrılır: şimal pilləsinə əsasən nüvələri assimetrik quruluşlu, yerli antiklinal qırıxıqlıqlarla mürəkkəbləşmiş, yüz metrədən kilometrə qədər uzanan əyri, döngəli, fasiləli braxiform qırıxıqlıqlar geniş yayılmışlar.

Cənub pillədə dar sinklinallarla, təsadüfi halda braxisinklinallarla ayrılmış sandıqvari antiklinal qırıxıqlıqlar geniş yayılmışlar. Cənub pillədə disharmonik qırıxıqlıq az yayılmışdır. Şimal tektonik pillə şimaldan Köhnəmədən qalxma-üstəgəlməsilə, cənubdan Sarıbaş qırılması ilə sərhədlənir.

Sarıbaş pilləsi (struktur formasiya zonası) daxilində dörd əsas mürəkkəb quruluşa malik qırıxıqlıq strukturları ayrılır. Axvay antiklinalı, Xurey sinklinalı, Sarıbaş antiklinalı, Kaflan sinklinalı.

Axvay antiklinalı aalenin yüksək plastikliyə malik gil şistli flişoidlərdən təşkil olunmuş və sadə quruluşu ilə səciyyələnilir. Morfoloji cəhətdən o, eninə kəsilişdə assimetrik quruluşu olan intensiv sıxılmış və cənuba çevrilmiş qırıxıqlıqlardan ibarətdir. Nisbətən kiçik cənub qanadı $55-75^{\circ}$, şimal qanadı isə $35-40^{\circ}$ bucaq altında düşür. Qırıxıqlığın ox müstəvisi $290-305^{\circ}$ azimuta malikdir. Yüksək plastikli süxurlardan ibarət nüvə və qırıxıqlığın cənub qanadı ox müstəvisinə paralel və ya kiçik bucaq altında münasibətdə olan çoxlu miqdarda antiklinal və sinklinallarda mürəkkəbləşmişdir. Mürəkkəb qırıxıqlıqların ölçüləri bir neçə on metrlərə qədər dəyişir. Xurey sinklinalı Axvay antiklinalından cənubda yerləşir. Onun geoloji quruluşu üst aalenin flişoid qatı və bayosun qum daşlarından təşkil olunmuşdur. Xurey sinklinalı

Kürmükçayın yuxarı hissələrindən başlayaraq şərqə doğru davam edir (Ə.Ş.Şıxəlibəyliyə (10) görə o şərqdə ikinci dərəcəli Xurey sinklinorisi adlandırılır). Ümumiyyətlə, təsvir etdiyimiz sinklinal kifayət qədər mürəkkəb quruluşa malikdir. O, cənub qanadı nisbətən az meyilli olmaqla şimal-şərqə 20-35° bucaq altında yatır. Şimal qanad isə çevrilmiş dik (65-80°) bucaq altında olmaqla, çox miqdarda parçalanma-pozulmaları ilə mürəkkəbləşmişdir.

Geoloji quruluşun ümumi fonunda bayosun qumdaşları, gil şistlərinin amplitudları bir metrədən bir neçə on metrə qədər hesablanan assimetrik antiklinal və sinklinal qırıxıqlıqlarla əzilmiş daxili disharmonik qırıxıqlıq aydın görünür.

Sarıbaş antiklinalı Xurey sinklinalından cənubda yerləşir. Cənubdan Sarıbaş qırılıb-qalxma üstəgəlməsi (Şıxəlibəyli Ə.Ş. şərqdə bunu Məlkəməud üstəgəlməsi adlandırır) ilə sərhədlənir. Nüvəsi gil şistlərindən, qanadları üst aalenin flişoid qatından ibarət olan Sarıbaş antiklinalı mürəkkəb assimetrik quruluşa malikdir. Bütünlüklə o cənuba atılmış uzununa və eninə qırılmalarla bir sıra bloklara bölünmüş iri sandıqvari qırıxıqlıqlardan ibarətdir.

Cənuba çevrilmiş qanadı şimal-şərqə 10°-30° azimutla 45°-60° altında, şimal qanadı sadə quruluşa malik olub, şimal şərqə 10-35° azimutla 30-35° bucaq altında yatırlar. Sarıbaş antiklinalı Qafqaz istiqamətindədir (295-300°).

Antiklinalın şarniri cənub-cənub şərq istiqamətində dərinləşərək 5-10° yarım bucağına malikdir. Şərqdə şarnirin 30-40° bucaqla dönməsi, örtülərək sönməsi müşahidə olunur. Əvvəllərə nisbətən cənubda yerləşən Sarıbaş antiklinalında əlavə qırıxıqlıq az inkişaf etmişdir. Onun geoloji quruluşunda bayosun qum daşları, nadir hallarda sinklinal qırıxıqlıqların muldalarını təşkil edən bat dövrünün lentvari gil şistləri iştirak edir. Bu sinklinal Kaflan sinklinalından sadə quruluşu ilə fərqlənir. Onun şimal qanadı cənuba çevrilmiş vəziyyətdə olub, şimal-şimal-şərq (15-30°) < 70-80° yatım bucağına malikdir. Nisbətən dar cənub qanadı İlisu qırılması ilə kəsilərək normal şəraitdə şimal-şərq 30-45° bucaq altında düşür. Kaflan sinklinal zonası antiklinallarla mürəkkəbləşmiş, iki əyri ikinci dərəcəli sinklinalları birləşdirir. Bu qırıxıqlıqlar da əsas struktur kimi, müstəviləri şimala yatan (45-80°, bəzən 85-910°) amplitudları 400-500 m-dən 100-50m-ə qədər olan xətti izoklinal, bəziləri braxiform qırıxıqlıqlarla mürəkkəbləşərək assimetrik quruluşa malikdir.

Sarıbaş zonasının bütün qırıxıqlıq strukturları çoxlu qırılma pozulmaları ilə mürəkkəbləşmişlər. Bunların içində ən nəzərə çarpan Sarıbaş qırılıb üstəgəlməsidir. O, Sarıbaş struktur formasiya zonasını şimal və cənub pilləsinə ayırır. Sarıbaş qırılıb-qalxma üstəgəlməsinin ümumi qalınlığı 200 m-ə qədərdir.

Eninə tektonik pozulmalar ümumi Qafqaz istiqamətinin əksinə, ona perpendikulyar olub böyük məsafələrdə izlənmirlər. (10-100m-lə), düşmə bucaqları isə 30-80° arasında, azimutu şimal şərqə 30-85°, şərq 90-110°, yaxud şimal-qərb 260-280 ° olub, təsadüfi hallarda cənuba yatırlar.

Əksər hallarda onların qalınlıqları 0,1-0,5 m-ə qədər olan ensiz qırılmalar şəklində olub, müstəvilərində sürtünmə gili və intensiv çatlarla xarakterizə olunurlar.

Sarıbaş struktur-formasiya zonası başlıca olaraq hüduqlarında braxiform sandıqvari qırıxıqlıqların əsas rol oynaması, üst aalen terrigen çökmə süxurların az dərəcədə dislokasiyası ilə əlaqədar olan dishormonik qırıxıqlıqların mövcudluğu və xüsusən də zəngin filizliliyə malik olması ilə digər struktur-formasiya zonalarından fərqlənir. Dislokasiya xarakterinə, terrigen süxurların yaşına və strukturların morfoloji tiplərinə görə Sarıbaş zonası iki paralelə yaxın, uzunluq istiqamətli ikinci dərəcəli tektonik pillələrə ayrılır.

Mİneraloji tərkibinə tekstur və struktur səciyyələrinə görə Sarıbaş filizləri mis-kolçedan-polimetallik formasiyasına mənsubdur. Əsas filiz əmələ gətirən minerallar pirit, xalkopirit, sfalerit, markazit, qalenit, maqnetit, hematit, ilmenit, rutil və cüzi miqdarda arsenopirit, molibdenit, qeyri-filiz minerallarından kvars, xlorit, serisit, muskovit, kalsit və s. ibarətdir.

Sarıbaş struktur formasiya zonasının geoloji öyrənilməsinin icmalını verərkən bu zonanın aşağıdakı səciyyəvi cəhətləri diqqəti cəlb edir.

- Yan süxurlar intensiv surətdə tektonik pozulmalarla mürəkkəbləşmiş, hidrotermal dəyişilmiş, 340-30 ° azimutda 60-70 ° meyl bucağında yatan gil, gilli alevrolit, qumdaşları növbələşməsindən ibarətdirlər.

- Zona boyu gil şistləri əzilmiş, doğranmış, sıxılmış, limonitləşmiş və iri kvars budinaları ilə zənginləşdirilmişdir.

- Aparılmış sınaqlaşdırma işləri göstərir ki, yan süxurlar tərkiblərində klark faizlərindən qat-qat yüksək mis, sink, qurğuşun, qızıl və gümüş saxlayırlar.

- Sulfidləşmə ümumi kütlənin 5-15%-ni təşkil edərək əsasən pirit, sfalerit, qalenit, xalkopirit-kvars xlorit tərkibli olub, yerüstü dağ qazmalarında yarım oksidləşmiş vəziyyətdə kəsilmişlər.

- Minerallaşmanın üst sərhədi konkresiyalı gil şistləri və qum daşlarının növbələşməsindən ibarət flişoid və fliş qatıdır.

- Minerallaşmanın alt sərhədi əsasən Sarıbaş dərinlik qırılmasıdır.

- Müxtəlif istiqamətli tektonik pozulmalarla doğranmış, hidrotermal dəyişilmiş süxurlar, hətta polimetalların olmadığı halda da qızıl və gümüşə müsbət nəticələr göstərir. Belə zonaların qalınlığı 100 m-ə qədər, bəzən isə daha çoxdur.

Yuxarıdakıları nəzərə alaraq həmin zonalar üzrə geoloji öyrənilmənin müxtəlif istiqamətlərində işlərin aparılmasına və əldə edilmiş nəticələrin dəqiqləşdirilməsi və zənginləşdirilməsinə zərurət yaranmışdır.

Mövcud məlumatların təhlilinin nəticəsi olaraq Sarıbaş struktur formasiya zonasında gələcəkdə aparılması vacib hesab edilən geoloji-kəşfiyyat işlərinin istiqamətlərini müəyyənləşdirmək olar.

Sarıbaş struktur formasiya zonasında mövcud filizləşmə sonaları üzrə axtarış-qiyətləndirmə işlərinin aparılması, strukturun mövqeyi nəzərə alınmaqla zonanın dərinlərdən öyrənilməsi məqsədilə kəşfiyyat quyularının qazılması, filizləşmənin davamlılığını, xarakterini, tekstur xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün imkan daxilində yeraltı dağ qazmalarının keçilməsi və nəcib elementlərin ərazidə daha ətraflı axtarışı işlərinin aparılması məqsəduyğundur.

ƏDƏBİYYAT

1. Кенгерли Т.Н. Этапность формирования покровов тектонически расслоенного альпийского чехла Большого Кавказа в пределах Азербайджана. АМЕА-nın Хəбərləri, Yer elmləri, 2004, № 4, s. 37-45.
2. Курбанов Н.К. Геологические основы прогноза цветных металлов в различных структурно-формационных зонах терригенной эвгеосинклинали Большого Кавказа. Труды, М.: Цнигри, в. 189, 1984, с.58-69.
3. Курбанов Н.К. Критерии поисков и принципы прогнозирования комбинированных колчеданно-медно-полиметаллических масторождений в Альпийской терригенной геосинклинали Б. Кавказа. М., Цнигри вып. 168, 1982, с. 87-97.
4. Məmmədov Ə. və başqaları, 1986-1989-cu illərdə Balakən-Zaqatala Filiz rayonunda aparılmış 1:50000 miqyaslı axtarış işlərinin nəticələri haqqında hesabat. Azgeolfond. Bakı, 1990. s. 28- 41.
5. Məmmədov İ., Yusifov A. 1994-2002-ci illərdə Böyük Qafqaz cənub-şərq hissəsinin Küngütçay filizləşmə sahəsində əlvan, nəcib və nadir metal filizlərinə axtarış işlərinin hesabatı. DİAF. Bakı, 2002, s. 36-48
6. Məmmədov İ.Ş., Nağıyeva K.S., Vəliyev H.A və b. Tikiş zonalarının yer qabığının tektonik quruluşunda rolu "Bilgi" dərgisi, Yer elmləri, №3, 2006, s. 61-64.
7. Səmədov A.M., Novruzov N.Ə. Böyük Qafqazın cənub yamacının terrigen və vulkanogen süxurlarının filizliyinin perspektivləri haqqında (Vəndamçay-Ağsu arası sahə). АМЕА-nın Хəбərləri, Yer elmləri, 2008, № 2, s. 47-51.
8. Səmədov A. 1994-2002-ci il Böyük Qafqaz Qalacıq filiz perspektivli sahəsinin mis kolçedan, mis polimetal və digər filiz axtarış işlərinin nəticələri haqqında hesabat. DİAF. Bakı, 2002.
9. Sərkərov. F.N. 1991-1997-ci illərdə Sarıbaş filiz sahəsində mis-kolçedan və mis-polimetal filizlərinə aparılan axtarış işlərinin nəticələri haqqında hesabat. Azgeolfond. Bakı, 2000, s. 87-89.
10. Шихалибейли Э.Ш., Курбанов В.В. Геологическое строение Дуруджинской шовной зоны в восточной части южного склона (междуречье Вандамчая и Ахохчая) Большого Кавказа. Известия АН Азерб. ССР, серия наук о Земле, 1979, № 2, с. 24-28.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ В САРЫБАШСКОЙ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОЙ ЗОНЕ

Э.Ф.ГАНБАРОВА

РЕЗЮМЕ

В статье дается обзор геолого-разведочных работ, проведенных в Сарыбашской структурно-формационной зоне южного склона Большого Кавказа.

Объясняется позиция и геологическое строение Сарыбашской структурно-формационной зоны в сравнении со смежными структурами южного склона Большого Кавказа.

На основании анализа существующей информации обоснованы и определены основные направления геолого-разведочных работ в Сарыбашской структурно-формационной зоне.

Ключевые слова: Сарыбаш, формационная зона, колчеданный полиметалл, медный колчедан, пирит, халькопирит, сфалерит, марказит, галенит, магнетит, гематит, ильменит, рулит и др.

THE PRINCIPAL DIRECTIONS OF GEOLOGICAL-EXPLORATORY WORKS IN SARIBASH STRUCTURAL-FORMATION ZONES

E.F.GANBAROVA

SUMMARY

The article describes the review of geological investigations in Saribash structural-formation zones of the southern slope of the Major Caucasus.

The author explains the position and geological construction of Saribash structural-formation zones in comparison with adjacent structures of the Major Caucasus.

As a result of the analysis of the existing data, the author provides basic and necessary directions of geological-exploratory works.

Key wolds: Saribash, formational zone, pyrite polymetal, copper pyrites, pyrites, chalcopyrite, sphalerite, marcasite, galenite, magnetite, hematite, ilmenite, rutil, etc.

Redaksiyaya daxil oldu: 14.03.2012-ci il

Çapa imzalandı: 23.10.2012-ci il