

Cədvəl 1

Sintez edilmiş birləşmələrin çıxımı, element analizi və fiziki-kimyəvi sabitləri

Birləşmələrin №-si	Çıxım, %-lə	Ərimə temperaturu, °C	Tapılmışdır, %				Brutto formulu	Hesablanmışdır, %				Rf
			C	H	N	S		C	H	N	S	
6	42	129-130	59,42	6,31	7,93	7,48	C ₉ H ₁₁ NOS	59,64	6,12	7,73	7,69	0,42
7	51	110-112	61,75	6,57	7,02	16,59	C ₁₀ H ₁₃ NOS	61,50	6,71	7,17	16,42	0,57
8	53	119-120	64,87	6,92	6,53	14,14	C ₁₂ H ₁₅ NOS	65,12	6,83	6,33	14,49	0,49
9	66	75-76	65,82	5,19	5,36	11,93	C ₁₅ H ₁₅ NO ₂ S	65,91	5,53	5,12	11,73	0,67
10	61	96-97	66,97	5,75	4,68	10,97	C ₁₆ H ₁₇ NO ₂ S	66,87	5,96	4,87	11,16	0,48
11	58	142-143	68,66	5,88	4,74	10,05	C ₁₈ H ₁₉ NO ₂ S	68,98	6,11	4,47	10,23	0,36

Cədvəl 2

Sintez edilmiş birləşmələrin (6-7) antioksidləşdirici xassələrini xarakterizə edən kinetik parametrlər

Birləşmələrin №-si	Formula	T=110 ⁰ C			T=60 ⁰ C		
		[InH]·10 ⁻⁴	K, l/mol·s	ν	K ₇ ·10 ⁻⁴ l/mol·s	f	[InH]·10 ⁻²
6	$ \begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{O} \quad \text{S} \\ \diagdown \quad / \\ \text{C} \\ \\ \text{N} - \text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5 \end{array} $	5·10 ⁻⁴	12	30000	2,13	2,5	5·10 ⁻⁵
7	$ \begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} \\ \quad \\ \text{O} \quad \text{S} \\ \diagdown \quad / \\ \text{C} \\ \\ \text{N} - \text{CH}_2\text{CH}=\text{CHC}_6\text{H}_5 \end{array} $	5·10 ⁻⁴	10	25000	2,72	1,8	5·10 ⁻⁵

görürük ki, inhibitorun peroksid radikalları ilə qarşılıqlı təsir reaksiyasının sürət sabiti (K_7) 2,12-2,72 bərabərdir. Tədqiq edilən birləşmələrin kumolhidroperoksida olan münasibəti də öyrənilmişdir. Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, 1,3-oksatılanlar (7,8) kumolhidroperoksidi katalitik parçalayır. Kumolperoksidin parçalanmasının kinetik parametrlərini analiz etdikdə görürük ki, birləşmələrin quruluşundan asılı olaraq katalitik faktor (ν) və onun sürət sabiti (K) dəyişir. Ən yüksək katalitik faktora $\nu = 3000$ N-benziləvəzli 1,3-oksatılan (7) malikdir. Onun katalitik parçalanmasını sürət sabiti də ($K=12$) sinnamiləvəzli 1,3-oksatılan (8) nisbətən yüksəkdir. Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, sintez edilmiş birləşmələri kombinə təsirinə malik olan inhibitorlar sinfinə aid etmək olar. Çünki onlar həm də peroksid radikallarının əmələ gəlməsini ləngidir, həm də kumolhidroperoksidi katalitik molekulyar məhsullara parçalayır.

TƏCRÜBİ HISSƏ

Sintez edilmiş birləşmələrin İQ spektri «Specord 76-IQ» cihazında vazelin yağında hazırlanmış məlhəm şəklində KBr, NaCl və LiF prizmalarından istifadə edilərək 600-3700 sm^{-1} sahəsində, NMR spektri isə Bruker-300 cihazında 300 MH tezliyində çəkilmişdir. Elüent kimi izopropil spirti-heksan (1:5) sistemindən istifadə edilmişdir.

2-(Sinnamilimino)-5-fenoksimetil-1,3-oksatılan (11) 1,75 q (0,01 mol) sinnamilizotiosianat, 1,4 q (0,01 mol) 1,2-epoksi-3-fenoksipropan və 2,01 q (0,01 mol) tetrametilammonium-yodid 20 ml toluolda həll edilir. Reaksiya qarışığı sürətlə qarışdırılır və onun temperaturu 100°C qədər qaldırılır. Həmin temperaturda 10 saat müddətində qızdırma davam etdirilir. Sonra reaksiya qarışığı soyudulur. Su ilə yuyulduqdan sonra, reaksiya qarışığı NaSO_4 üzərində qurudulur. Toluol qovulduqdan sonra alınmış kristallar etil spirti ilə yenidən kristallaşdırılır. 1,8 q 2-(sinnamilimino)-5-fenoksimetil-1,3-oksatılan (11) alındı. Çıxım 58 % təşkil edir. Ərimə temperaturu $142-143^\circ\text{C}$.

Tapılmışdır, %: C 68,66; C 5,88; N 4,74; C 10,05;

$\text{C}_{18}\text{H}_{19}\text{NO}_2\text{S}$

Hesablanmışdır, %: C 68,98; C 6,11; N 4,47; S 10,23;

$R_f=0,36$. Elüent heksan-izopropil spirti (5:1)

Analoji üsulla digər 1,3- oksatılanlar (6-10) sintez edilmişdir. Onların element analizi, çıxımı və fiziki kimyəvi sabitləri cədvəl 1-də verilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Rao A.S., Paknikar S.K., Kirtane J.G. Tetrahedron, 1983, v. 39, № 14, p. 2323-2367.
2. Gorzynsky Smith J. Synthesis, 1984, № 8, p. 629-656.

3. Грибов Л.Н., Синеоков А.П., Этлис В.С. Успехи химии, 1966, т 35, № 9, с. 1574-1587.
4. Аллахвердиев М.А., Алиев А.Б., Керимов В.И., Курбанов К.Б. Известия ВУЗ-ов. Химия и химическая технология, 1993, т 36, № 1, с. 26-30.
5. Общая органическая химия. Пер. с англ., т 5, М., 1983, с. 473-479.
6. Аллахвердиев М.А., Баваи Р.М., Фарзалиев В.М., Алиев Ш.Р., Рзаева И.А. Нефтехимия, 2001, т 41, № 2, с. 153-157.

ЦИКЛИЗАЦИИ ИЗОТИОЦИАНАТОВ С ОКСИРАНАМИ

**А.М.МАГЕРРАМОВ, З.И.АХМЕДОВА, Г.КУРБАНОВА,
И.А.РЗАЕВА, М.А.АЛЛАХВЕРДИЕВ**

АННОТАЦИЯ

Синтезированы 2-(арилимино)-5-метил(феноксиметил)-1,3-оксатиаланов при циклоприсоединении изотиоцианатов с оксиранами.

CYCLIZATION OF ISOTHIOCYANATE WITH OXYRANES

**A.M.MAGERRAMOV, Z.I.AKHMEDOVA, G.GURBANOVA,
I.A.RZAYEVA, M.A.ALLAKHVERDIYEV**

ABSTRACT

It has been synthesized 2-(arylamino)-5-methyl-(fenoxymethyl)-1,3-oxathiolanes by cycloadditions of isothiocyanates with oxyranes.