

1,2-AMİNPROPANTIOLLARIN DİAMİNDİSULFİDLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİ VƏ ONLARIN İNHİBİTORLAŞMA XASSƏSİ


A.T.HÜSEYNOVA

Tərkibində ikiliamin saxlayan 1,2-aminpropantiollar dimetilsulfoksidin vasitəsilə diamindisulfidlərə çevrilmişdir. Alınmış diamindisulfidlərin inhibitorlaşma xassəsi xemilüminesensiya metodu ilə tədqiq edilmişdir.

Aminpropantiolların sintez edilməsi və onların reaksiyaya girmə qabiliyyəti sahəsində tədqiqatları davam etdirərək 1,2-aminpropantiolların dimetilsulfoksidin köməyi ilə diaminsulfidlərə çevrilməsi tədqiq edilmişdir.

Məlumdur ki, amintiolları diamindisulfidlərə çevirmək üçün müxtəlif oksidləşdiricilərdən (molekulyar oksigen, hidrogen peroksid, tetrasyonat, yod, üç valentli dəmirin biogenli birləşməsi və s.) istifadə edilir. Adətən reaksiya mülayim şəraitdə aparılır. Əgər oksidləşmə reaksiyası daha sərt şəraitdə aparılsa, onda sulfen, sulfin və sulfon birləşmələri alınır. Ədəbiyyatda qeyd edilən oksidləşdiricilərdən istifadə edərək, müxtəlif quruluşda amintiolları diaminsulfidlərə çevirmişlər. Bütün bu sahədə olan işlər monoqrafiyada cəmləşdirilmişdir [2].

Yuxarıda bütün qeyd edilənlərə baxmayaraq, amintiolların sulfoksidlər ilə diamindisulfidlərə oksidləşməsinə dair ədəbiyyat məlumatları olduqca azdır. Bu haqda indiyə qədər yalnız bir neçə işə təsadüf edilir [1]. Bütün yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq əvvəlcə sintez etdiyimiz bəzi 1,2-aminpropantiolların (HV) [3-4] dimetilsulfoksidlərlə qarşılıqlı reaksiyasından diamindisulfidlər alınmışdır:




R=H, CH₃O, C₂H₅O, i-C₃H₇O, i-C₄H₉O

Diamindisulfidlər (V-IX) özlü maye birləşmələridir. Onların

element analizi, fiziki-kimyəvi sabitləri cədvəldə verilmişdir

Sintez edilmiş diamindisulfidlərin quruluşu IQ və PMR spektroskopiyaya üsulları ilə təsdiq edilmişdir. Onların təmizliyi isə narin təbəqəli xromatoqrafiya və element analiz üsulu ilə yoxlanılmışdır.

1,2-Amintiollardan diamindisulfidlərin alınması reaksiya mexanizminin sxemi aşağıdakı kimi ehtimal edilir.



Birinci mərhələdə az dayanıqlı aralıq məhsulu alınır. Sonradan ikinci amintiolun molekulu təsiri ilə diamindisulfid, diakilsulfid və su alınır.

Ədəbiyyat məlumatlarından [5] aydın olmuşdur ki, tiolların dimetilsulfoksid ilə disulfidlərə oksidləşməsində üçlü aminlər katalizator rolunu oynayır. Amintiolların molekullarında amin qrupu olduğuna görə çox güman ki, daxili kataliz hesabına diamindisulfidlərin alınması sürətlə gedir və çıxım yüksək olur.

Xemilüminesensiya üsulu ilə müxtəlif aromatik birləşmələrinin antioksidləşdirici xassəsi müvəffəqiyyətlə təyin edilir. Bu onunla əlaqədardır ki, oksidləşmə reaksiyasının sürəti peroksid radikallarının rekombinasiyası hesabına baş verən reaksiyası zamanı yaranan işıqlanma ilə düz mütənəsbdir:

$$J \sim K_6 [\text{RO}_2]^2$$

$[\text{RO}_2]$ - peroksid radikallarının qatılığı,

K_6 - peroksid radikallarının rekombinasiyası reaksiya sürətinin sabiti.

Sistemə peroksid radikalları ilə qarşılıqlı təsirdə olan antioksidləşdirici daxil etdikdə, peroksidlərin qatılığı azaldıqda, işıqlanmanın zəiflədiyi müşahidə olunur. Sistemə əlavə edilən antioksidləşdiricilərin səmərəliliyi işığın zəifləməsi hadisəsinə görə qiymətləndirilir.

Tədqiq edilən birləşmələrin xemilüminesensiya intensivliyinə təsirini öyrənmək üçün AMEA-nın akademik Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunda (AKİ) və Rusiya EA Kimyəvi Fizika İnstitutundakı yaradılmış CHK-7 xemilüminesensiya qurğu-

sundan istifadə edilmişdir.

İnhibitorun antioksidləşdirici effektivliyi alınmış nəticələrə əsaslanaraq aşağıdakı formulaya əsasən təyin edilmişdir:

$$\vartheta = \left(1 - \frac{J}{J_0} \right) \cdot 100\%$$

$\frac{J}{J_0}$ kəmiyyəti - vazelin yağının təcrübə zamanı inhibitorla və

inhibitorsuz oksidləşməsi nəticəsində udulan oksigenin və ya xemilüminesensiya işıqlanma intensivliyinin sahəsi AMEA-nın AKİ-də CHK-7 qurğusunda edilmiş dəyişiklik xemilüminesensiya işığının intensivliyini təyin etməklə yanaşı, həmçinin yağın udduğu oksigenin miqdarını və oksidləşmənin induksiya dövrünü də təyin etmək imkanını verir.

Sintez edilmiş birləşmələrin antioksidləşdirici təsir effekti ilə onların quruluşu arasındakı əlaqəni müəyyən etmək üçün tədqiq edilən birləşmələrin vazelin yağında 0,1; 0,5 və 1 %-li qatılıqda olan məhlullar hazırlanmışdır. Hər bir birləşmədən nümunə üçün 5 ml. götürülür. Sınaq DYİST 3582-52-yə müvafiq olaraq 100 dəqiqə müddətində 20°C temperaturda aparılır. Sınaq xətti işığın xemilüminesensiya intensivliyinin dəyişikliyi potensiometrin lentində avtomatik olaraq yazılır. Sınaqdan keçirilən birləşmələrin effektivliyi sənayedə antioksidləşdirici aşqar kimi tətbiq olunan və etalon kimi istifadə olunan ionol (4-metil-2,6-diüclübutilfenol) ilə müqayisə edilmişdir.

Sintez edilmiş birləşmələrin antioksidləşdirici xassələrinin sınaqları cədvəl 2-də verilmişdir. Cədvəldən görüldüyü kimi, sınaqdan keçirilən diamindisulfidlərdən vazelin yağına 0,1; 0,5 və 1% miqdarında daxil etdikdə xemilüminesensiya işıqlanmasına görə antioksidləşdirici effekt 48-89 % edir və özlərinin antioksidləşdirici effektivliklərinə görə etalon kimi istifadə olunan ionoldan xeyli üstünlüyə malikdirlər. Cədvəldə verilmiş diamindisulfidləri bir-biri ilə müqayisə etdikdə görürük ki, diamindisulfid molekulunda alkoksi qrupların (VI-IX) böyüməsi antioksidləşdirici xassəyə heç də təsir etmir.

Bütün yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, sintez etdiyimiz birləşmələr vazelin yağının oksidləşməsinin qarşısını alaraq öz inhibitorlaşma xassəsinə görə sənaye inhibitoru olan ionoldan daha yüksək antioksidləşdirici xassə göstərir.

Cədvəl 1
Perflüor tərkibli diamindisulfidlərin (V-IX) çıxımı, sabitləri və
element analizini xarakterizə edən kəmiyyətlər

Birləşmələrin №-si	Çıxım % -lə	n_D^{20}	Tapılmışdır				Brutto formul	Hesablanmışdır				Rf
			C	H	N	S		C	H	N	S	
V	92	1,6217	65,19	7,03	8,57	19,41	$C_{18}H_{24}N_2S_2$	65,02	7,28	8,42	19,28	0,41
VI	87	1,6132	61,32	7,06	7,28	16,13	$C_{20}H_{28}N_2O_2S_2$	61,19	7,19	7,14	16,33	0,54
VII	90	1,6017	62,99	7,42	6,27	15,04	$C_{22}H_{32}N_2O_2S_2$	62,82	7,67	6,66	15,25	0,36
VIII	93	1,5981	64,03	8,28	6,41	14,05	$C_{24}H_{36}N_2O_2S_2$	64,25	8,09	6,24	14,29	0,48
IX	97	1,5871	65,27	8,71	5,97	13,27	$C_{26}H_{40}N_2O_2S_2$	65,50	8,46	5,88	13,45	0,34

Cədvəl 2
Sintez edilmiş birləşmələrin antioksidləşdirici
xassələrinin sınaq nəticələri

V	0,1	65
	0,5	72
	1,0	89
VI	0,1	57
	0,5	70
	1,0	86
VII	0,1	53
	0,5	68
	1,0	83
VIII	0,1	53
	0,5	69
	1,0	85
IX	0,1	58
	0,5	72
	1,0	88
İonol	0,1	48
	0,5	60
	1,0	66
Vazelin yağı	-	0

Təcrübi hissə

Sintez edilmiş birləşmələrin IQ spektrini «Specord-75-IQ» cihazında maye təbəqədə və ya vazelin yağında hazırlanmış məlhəm şəklində KBr, NaCl və LiF prizmalarından istifadə edərək $600-3700\text{ sm}^{-1}$ sahəsində çəkilmişdir. ^1H və ^{13}C NMR spektrləri isə «Varian VXR-300» cihazında alınmışdır. Sintez olunmuş birləşmələrin narın təbəqəli xromatoqrafiyası Suilfol-254 plastinkalarında aparılmışdır. Elüent kimi butanol-heptan (1:5 və ya 5:3) sistemlərindən istifadə edilmişdir. Bütün hallarda yod buxarı ilə aydınlaşdırıldıqda bir ləkə alınır.

1-(N-Fenilamino)-2-propantiolun (I) disulfidinin sintezi.

Termometr ilə təchiz olunmuş üçboğazlı kolbaya (0,05 mol) 1-(N-Fenilamino (I) 50 ml dimetsulfoksiddəki məhlulu yerləşdirilir və 80-90°C -də 10 saat müddətində sürətlə qarışdırılır. Reaksiyanın gedişinə narın təbəqəli xromatoqrafiya üsulu ilə nəzarət edilmişdir. Reaksiya qarışığı soyudulur və 500 ml su ilə üç dəfə yuyulur və dimetil sulfoksiddən azad olunur. Reaksiya məhsulu efiərdə həll edilir və natrium-sulfat üzərində qurudulur. Həllədicisi su nasosu ilə qovulduqdan sonra, reaksiya məhsulu Brokmana görə ikinci aktivliyə malik alüminium-oksidi ilə doldurulmuş kalonkadan keçirilir. Elüent kinil etilasetat-benzol (2:5) qarışığından istifadə edilmişdir. 15,2 % disulfid (V) alındı. Çıxım 90 % təşkil edir. n_D^{20} 1,6217, $R_f=0,41$. Tapılmışdır, % C 65,19; H 7,03; N 8,57; S 19,41. $C_{18}H_{24}N_2S_2$.

Hesablanmışdır, % : C 62,02; H 7,28; N 8,42; S 19,28.

Analoji üsulla müxtəlif 1,2-aminpropantiolların (II-IV) dimetilsulfoksidi ilə oksidləşdikdə diamindisulfidlər sintez edilmişdir. Onların çıxımı fiziki-kimyəvi sabitləri və element analizi cədvəl 1-də verilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Oae C. Химия органических соединений серы. М.: Химия, 1975, 511 с.
2. Рачинский Ф.Ю., Славчевская Н.М. Химия аминотиолов. Ленинград: Химия, 1965, 295 с.
3. Westland R., Маух М., Holmes L., Godey R. // J. Med. chem. 1972, v. 15, № 9, p. 968-973.
4. Аллахвердиев М.А., Гусейнова А.Т., Фарзалиев В.М., Султанов Ю.М., Гаджиева А.А. // Нефтехимия. 1990, т. 30, № 4, 570-573 с.
5. Аллахвердиев М.А., Гусейнова А.Т., Фарзалиев В.М., Султанов Ю.М., Ибрагимов Н.Ю. // Нефтехимия. 1989, т. 29, № 2, 275-277 с.

ПРЕВРАЩЕНИЕ 1, 2-АМИНОПРОПАНТИОЛОВ В ДИАМИНОДИСУЛЬФИДЫ И ИХ ИНГИБИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА

А.Т.ГУСЕЙНОВА

РЕЗЮМЕ

1, 2-аминопропантиолы, содержащие вторичный амин, с помощью диметилсульфоксида были превращены в диаминодисульфиды. Методом хемиллюминесценции были исследованы ингибирующие свойства синтезированных диаминосульфидов.

THE TRANSFORMATION OF 1,2-AMINOPROPANETHIOLS TO DIAMINODISULPHIDES AND THEIR INHIBITOR PROPERTIES

A.T.GUSEYNOVA

SUMMARY

The 1,2-aminopropanethiols which containing secondly amine, have been transformed to diaminodisulphides at the presence of demethylsulphoxide. The inhibitor properties of synthesized diaminodisulphides were investigated by the method of chemiluminescence.