

BİOLOGİYA**ABŞERONDA YAYILMIŞ İYDƏ BİTKİSİNİN
MİKOBİOTASININ PATOGEN NÜMAYƏNDƏLƏRİ**

A.Ş.İBRAHİMOV, T.S.AĞAYEVA
Bakı Dövlət Universiteti

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, iydənin mikobiotasına 34 növ daxildir ki, onların da bir çoxu həmin bitkidə müxtəlif patolojiyalar törədir. Patogenlər arasında ən geniş yayılanı və iydə üçün ən təhlükəlisi Eryziphe comminus Grev. f. Elaeagni Jacz göbələyidir.

Abşeronda geniş yayılmış quru-subtropik meyvə bitkilərindən biri də iydədir (*Eleagnus angustifolia* L.). Boyca iri və sürətlə inkişaf edən bitkilər qrupuna aid edilən iydənin meyvəsi bir sıra vitaminlər və mineral maddələrlə zəngindir. Ən çox bal arısının istifadə etdiyi bitkilərdəndir. Digər tərəfdən, bu bitkidən meşə zolaqlarının salınmasında, habelə şəhərimizin yaşıllaşdırılmasında da geniş istifadə olunur.

Belə böyük əhəmiyyət kəsb edən bu bitki bir sıra göbələk xəstəliklərinə də məruz qalır [7]. Bu xəstəliklər bitkini ya tamam məhv edir, qurudur və yaxud onun məhsulunu yararsız, istifadəsiz hala salır.

Buna görə də təqdim olunan işin məqsədi Abşeronda yayılmış iydə bitkisinin mikobiotasının və onun patogen nümayəndələrinin öyrənilməsi olmuşdur. Bu məqsədlə 2003-2006-cı illərdə yaz, yay və payız fəsilələrində Abşeronun müxtəlif yerlərində bitən iydə bitkisinin vegetativ orqanlarından nümunələr götürülmüş və laboratoriya şəraitində işin məqsədinə müfəviq məlum metodlarla [1, 2] analiz edilmişdir.

Göbələklərin təmiz kulturaya çıxarılması zamanı qidalı mühit kimi aqarlaşdırılmış səməni şirəsindən, Çapek, Çapek-Doks, düyülü aqar və kartoflu aqardan istifadə edilmişdir. Bəcərmə 3 gün müddətinə 25°C-də aparılmışdır.

Göbələklərin və onların törətdiyi xəstəliklərin təyini zamanı isə məlum təyinat kitablarından [3-6, 8] istifadə edilmişdir.

Aparılan tədqiqatların gedişində iydə bitkisinin 34 göbələk növünün yayılması aşkar edilmişdir. Taksonomik strukturuna görə qeydə alınan göbələklərin çox hissəsi (~54%) qeyri-müəyyən göbə-

ləklərə (Deutromycota), askomisetlərin (Ascomycota) nümayəndələri sayca ikinci (~28%), bazidiomisetlər (Basidiomycota) isə üçüncü (~10%), qalan hissəsi isə (~8%) ziqomisetlərə (Zigomycota) aiddir.

Mikrobiotanın patogen nümayəndələri arasında isə ən geniş yayılanı *Eryziphe comminus* Grev. f. *Elaeagni* Jacz. göbələyidir. Belə ki, tədqiqatların aparıldığı dövrdə onun yayılma dərəcəsi 20-25% arasında dəyişmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, monofaq-biotrof həyat tərzini keçirən [5] bu göbələk iydə bitkisinin külləmə xəstəliyinin törədicisidir. Göbələk aprel ayından başlayaraq iydə bitkisinin vegetativ orqanları üzərində, meyvəsi də daxil olmaqla mitseli yığımindan ibarət bozuntul örtük əmələ gətirir. Maraqlıdır ki, mitselilərdə apresporilər əmələ gəlir ki, bunların nəhayəti əmziyi xatırladır. Bütün bunları iydə hüceyrələrində görmək mümkündür. Mitseli üzərində göbələyin konididaşıyanları düzülür. Konididaşıyanlar sadə quruluşdadır, budaqlanmırlar. Konididaşıyanlar üzərində göbələyin kürəvi formalı, rəngsiz konidiləri müşahidə edilir. Konididaşıyan üzərində konidilər bazipetal zəncir əmələ gətirirlər. Bu göbələk yığımları kül rəngində olduğu üçün xəstəliyin adı da buradan götürülmüşdür. Beləliklə, bu göbələk yay fəsilində daha böyük sürətlə yayıla bilir. Çox maraqlıdır ki, bitkinin bütün yarpaq, budaq və meyvələri kül rəngli yığımla örtülür. Mitseli yığımları yarpağın üst səthini, budaq və meyvəni isə bütünlüklə örtür. Aparığımız müşahidələr göstərdi ki, göbələyin meyvə cismi yalnız sentyabr ayının əvvəlində əmələ gəlir. Yarpaq üzərindəki, mitseli yığımlarında kleystotetsilərin sayı daha çoxluq təşkil edir. Kleystotetsilər şar formasında və tünd qara rəngli olur.

Sağlam iydə yarpaqlarını bu göbələyin mitselisi ilə süni şəkildə yoluxdurduqdan 8 gün sonra yarpaqlar üzərində mitseli, konididaşıyan və konidi yığımları əmələ gəlməsi müşahidə edilir. Daha sonra həmin yarpaqlar soyuducuda və otaq temperaturunda 30 gün saxlandı, lakin bu müddət ərzində meyvə cisminin əmələ gəlməsi müşahidə edilmədi. Bu məqsədlə müxtəlif qidalı mühitlərdən istifadə edilsə də, meyvə cisminin 30 gün müddətinə əmələ gəlməsi təkrarən müşahidə olunmur. Müəyyən oldu ki, Çapek qidalı mühitində bu göbələk daha yaxşı inkişaf edir. İstər təbii mühitdə (iydə bitkisi üzərində), istərsə də Çapek qidalı mühitində göbələyin konididaşıyan və konidisinin ölçüsü oxşardır. Konididaşıyanların ölçüsü 120-210x2,5-3,5 mkm ölçüdədir. Konidilər isə 30-35x20-25 mkm-dır. Kleystotetsinin ölçüsü 80-110 mkm, kisəsi isə 60-70 mkm, kisə sporları isə 20-30x10-15 mkm ölçüdədir.

Tədqiqatların gedişində iydənin mikrobiotasına daxil olan patogenlərin geniş yayılan nümayəndələrindən (yayılma dərəcəsi - 18-23%) biri də *Phoma elaeagnella* Cke-Grevillea göbələyinin olması müəyyən edilmişdir. Bu göbələyin təsirindən iydənin yarpaqları üzərində xırda ləkələr əmələ gəlir. Bu ləkələr bəzi yarpaqlar üzərində bir-birilə birləşib bütün yarpaq səthini tutur. Mikroskopda piknidilər şar formasında görsənir, lakin üst hissədən nisbətən basıqdır. Tünd şabalıdı rəngdədir, ölçüsü 90-155 mkm diametridədir. Piknidilərin üst hissəsində ölçüləri 120-130 mkm olan əmzikvari çıxıntılar olur.

Phyllosticta elaeagni (Sacc.) Allesch əmələ gətirdiyi ləkələr yarpağın hər iki tərəfində müşahidə olunur ki, bu da özünü hər bir

tərəfdə 4-5 iri ləkə şəklində bürüzə verir. Ləkələrin kənarı ağ rənglə haşiyələnir. Maraqlıdır ki, ləkələrin mərkəzi tünd şabalıdı rəngdədir. Adi gözlə baxdıqda belə piknidilər aydın görsənir. Piknidilər şar şəkillidir, tünd şabalıdı rəngdədir. Ölçüləri 120-140 mkm diametridədir. Piknidilər üzərində nazik tükcüklər vardır ki, ölçüləri 150-259 mkm-dir. Konidilər silindrikdir, 2-3 arakəsməsi vardır. Arakəsmənin ölçüsü 8,5-10,5x3,5-4,5 mkm-dir.

Cytospora elaeagni All.- *Hedwigia* göbələyi də yarpaqlar üzərində qeydə alınmışdır və bunun əmələ gətirdiyi ləkələr yarpağın üst və alt səthində təmamilə qurumuş halda müşahidə olunur. Bəzi hallarda ləkələrə yarpağın saplağında rast gəlinir. İstər yarpaqda, istərsə də saplaqda qara rəngli konididaşıyan və konidi müşahidə edilir. Üzərində zəif tükcüklər olan, xırda, çoxlu sayda konididaşıyanlar vardır. Bu tükcüklər də çox gödəkirlər. Konididaşıyanlar 10-20x1,5-2 mkm ölçüdədir. Konidilər uzunsovdur, qara rənglidir, 5-6,5x1,5-2 mkm-dir.

Cercospora polygonati Rostrup göbələyi iydə yarpağının hər iki tərəfində boz rəndli mitseli yığıcı əmələ gəlir. Mitseli yarpaq üzərində xırda ləkələr əmələ gətirir. Yarpağın hər iki tərəfinə sanki toz tökülüb. Bu göbələk növü kartoflu-aqar qidalı mühitində yaxşı inkişaf edir və tünd boz rəngdədirlər, ölçüləri 40-45x2,5-3,5 mkm-dir. Bu göbələk növü iydə yarpaqları üzərində biotrof həyat keçirir. Tədqiqatların gedişində kisə dövrü müşahidə edilmədi.

Alternaria dianthi. Stevens et Hall göbələyi yaşıl yarpaqda və yetişməmiş meyvə üzərində aşkar edilmişdir. Yarpaq və meyvə üzərində yaşayan bu göbələk növü yarpaq və meyvənin hər ikisini çürüdür və biotrof həyat tərzinə malikdir. Mitseli üzərində konididaşıyanlar tək-tək düzülürlər, 2-4 arakəsmədirlər. Konididaşıyanlar zeytuni rəngdədir. 30-60x4-6 mkm ölçüdədir. Konididaşıyan üzərində konidilər əsasən zəncir əmələ gətirirlər. Konidilərdə eninə 4-6 və uzununa 3-4 arakəsmələr vardır. Biz Alternariyanın bu növünü bir neçə süni qidalı mühitlərdə əkdik və məlum oldu ki, bu göbələk növü üçün Çapek qidalı mühiti ən yaxşısıdır.

Tədqiqatların gedişində *Macrosporum Solani* Ellis et Martin göbələyi isə yetişmiş iydə meyvəsi üzərində müşahidə olunmuşdur. İydə meyvəsi üzərində iri (10 mm) kürevi, dairəvi ləkələr əmələ gəlir. Ləkələr əsasən şabalıdı rəngdədir. Bu göbələk Çapek qidalı mühitində əkildi və mitseli Petri qabını 5 gün müddətində təmamilə doldurdu. Mitseli üzərində konididaşıyanlar qrup halındadırlar. Ölçüləri 80-120x3,5-4,5 mkm-dir. Maraqlıdır mitselidə konididaşıyan və konidilər şabalıdı rəngdədir. Konidilər sancaq formasındadırlar, 70-120x12-25,5 mkm ölçüdədirlər.

Sphaerulina irtermixta Sarc. göbələyi isə yarpaq və cavan budaqlar üzərində yumşaq, ətli peritetsinin olması ilə xarakterizə olunur. Peritetsilər cavan budaq və yarpaqlar üzərində qrup halında əmələ gəlirlər. Göbələyin peritetsisi dəriyə bənzəyir və qara rənglidir. Bu göbələk növü yaşıl yarpaqlarda və cavan budaqlarda biotrof həyat keçirir. Peritetsinin ölçüsü 130-190 mkm-dir. Meyvə cisminin içərisində kisələr qrup halında düzülürlər. Kisələr yumurta formasındadırlar və bir-birinə yapışmış, nizamla düzülüşlər. Kisələrin ölçüsü 40-50x 12-18 mkm-

dir. Sporlar da kisəyə oxşayır, yumurtaya bənzəyir, 2-3 eninə arakəsmələr vardır. Sporlar əsasən rəngsizdirlər, lakin bəziləri sarı rəngdə olur. Ölçüləri 20-25x4-6 mkm-dir. Bu göbələk növü biotrof olduğu üçün iyul ayından etibarən yarpaq və cavan budaqları qaraltmağa, avqust ayının əvvəlində yarpaqların tökülməsi başlayır.

Nectria cinnabarina (Tode) Fr göbələyi qurumuş budaqlarda aşkar edilmişdir. Loja ətlidir, yumşaqdır, iridir. Lojalar qırmızı rəngdədir, 2-3 mm diametrindədir. Meyvə cismi parafizsizdir. Kisələr sancığa oxşayır, 90-120x15-20 mkm uzunluqdadır. Kisə sporları uzunsovdur, 2-3 eninə arakəsməlidir, rəngsizdir və ölçüləri 15-20x4,5-8,5 mkm-dir.

Fomitopsis cytisina (Berk.) Bond göbələyi iydənin gövdəsi üzərində at dırnağına bənzər, mantarlaşmış (probkaya oxşar) ağaclamış şəkildə rast gəlinir. Bu cins iydə bitkisi üzərində geniş yayılan göbələklərdən sayılır. Göbələk çoxillik möhkəm meyvə cismi ilə seçilir. Bu göbələk fakültativ biotrof həyat tərzini keçirir və aqarlaşdırılmış səməni şirəsində təmiz kulturaya çıxarılması elə bir çətinlik törətmir. İydə gövdəsi üzərində bu göbələk növünün meyvə cismi 15-20x10-30 sm ölçüdədir. Meyvə cismi əvvəl yaşıl rəngdə olur, sonrada yaşlandıqca qara rəng alır. Bu göbələyin mitseli hiqləri rəngsizdir. Bazidilər 10-20x8-10 mkm ölçüdədir. Sporlar şar və yaxud yumurta formasındadır, ölçüləri 5-8x4-6,5 mkm-dir.

Beləliklə, aparılan tədqiqatlarda iydə bitkisinin patologiyaya törədən və bitkinin yarpaqlarında daha tez-tez müşahidə olunan 10 növ göbələk aşkar edilmiş, müəyyən edilmişdir ki, bunların ən təhlükəlisi külləmə göbələyidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Левитин М.М., Тютюрев С.Л. Система наблюдений за развитием болезней. // Защита и карантин растений, 2003, №11. с.81-83.
2. Методы экспериментальной микологии/Под. ред. Билай В.И. Киев: Наукова думка, 1982, 500с.
3. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. Москва. "Агропромиздат", 1989, 480 стр
4. Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель, т.1. Киев: Наукова думка, 1977, 160с.
5. Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель, т.2. Киев: Наукова думка, 1977, 299с.
6. Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель, т.3. Киев, Изд. Наукова думка, 1978, 175с.
7. Султанова Н.Ш. Микобиота сухих субтропических плодовых культур Апшеронского полуострова. Автореф. дисс. на соискание канд.биол.наук. Баку, 2000, 26с.
8. Хохряков М.К., Доброзракова-Степанов К.М., Летова М.Ф. Определитель болезней растений. Санкт-Петербург: Наука, 2003, 535с.

**ПАТОГЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИКОБИОТЫ
ЛОХА РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НА АПШЕРОНЕ**

А.Ш.ИБРАГИМОВ, Т.С.АГАЕВА

РЕЗЮМЕ

В результате проведенных работ установлено, что в микобиоту лоха входят около 34 вида, среди которых имеются грибы, вызывающие различные патологии. Среди патогенов гриб *Eryziphe comminus* Grev. f. *Elaeagni* Jacz является более широко распространенным и опасным для лоха.

**PATOGEN REPRESENTATIVE OF SMELL TREE'S
MIKOBİOTA THAT WİDE-SPREAD IN ABSHERON**

A.Şh.İBRAHİMOV, A.A.AGAYEVA

SUMMARY

It has been known in the result of carrying out investigations that mikobiota is 34 kinds interior smell that their somebody procreates different patalogies in the same plant, too. The person which spreads the widest between patogens and the person which spreads the widest the most dangerous *Eriziphe comminus* Grev.f. *Elaeagni* Jacz for in the smell.