

**OZONUN VƏ HİDROGEN PEROKSİDİN NORMADA
VƏ NaCl ŞORANLIĞI ŞƏRAİTİNDƏ KÖKLƏRİN ANTIOKSİDLƏŞDİRİCİ
AKTİVLİYİNƏ TƏSİRİ****S.İ.MUSTAFAFAYEV, N.A.QASIMOV**
Bakı Dövlət Universiteti

Ozonun və H_2O_2 məhlulunun normada və NaCl şoranlığı şəraitində buğda və noxud toxumlarının cücərməsinə, cücərtilərin köklərinin, gövdəsinin böyüməsinə və köklərin antioksidləşdirici aktivliyinə təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, ozonun və H_2O_2 -lə təsirdən normada və şoranlıq şəraitində buğda və noxud toxumlarında kontrol variantla müqayisədə toxumların cücmə enerjisi, cücərtilərin köklərinin və gövdələrinin böyüməsi sürətlənir. Ozon və H_2O_2 işlənmiş toxumlardan alınmış cücərtilərin köklərində antioksidləşdirici aktivliyin azalması müşahidə edilir, NaCl şoranlığı şəraitində becərilən cücərtilər də bu azalma daha kəskin xarakter daşıyır.

Bitkilər onları əhatə edən mühitdəki oksidləşdirici stressdən və aktiv oksigenin canlı sistemə göstərdiyi dağıdıcı təsirdən müdafiə olunmaq üçün çox müxtəlif müdafiə sistemlərinə malikdirlər. Təkamül prosesinin gedişində stress faktorlarının təsirinə qarşı müxtəlif müdafiə mexanizmləri qazanmış bitkilər bir qayda olaraq orqanizmdə çoxlu miqdarda α -tokoferol, askorbin turşusu, tərkibində SH-qrupu saxlayan birləşmələr, karotinoidlər, riboflavinlər, polifenollar kimi antioksidantların toplanması ilə səciyyələnilirlər. Bu və digər antioksidantlar birlikdə orqanizmin ümumi antioksidləşdirici aktivliyini (AOA) təşkil edir.

Digər tərəfdən ətraf mühitdə düzların qatılığının normadan artıq olması da bitkilərdə stress əmələ gətirən əsas kimyəvi faktorlardan biri hesab olunur.

Son illər əkinçilik təcrübəsində geniş istifadə olunan bitkilərin məhsuldarlığının daha da artırılmasına yönəldilən tədbirlər sırasında yüksək məhsuldarlığa malik olan bitki sortlarının yaradılması ilə yanaşı, tədqiqatçılar qarşısında ekstremal faktorların təsiri şəraitində də bitki genomundakı bioloji potensialdan tam istifadə olunmasına nail olmaq vəzifələri qoyulur.

İşin aktuallığı bir də onunla əlaqədardır ki, son zamanlar ətraf mühitdə güclü oksidləşdirici komponentlərin, o cümlədən sərbəst radikalın qatılığının artması hüceyrədaxili metabolizmin pozulması ehtimalını çoxaldaraq, bitki orqanizmində gedən mühüm fizioloji funksiyaların koordinasiyasının pozulmasına və ümumilikdə bitkinin məhv olmasına gətirib çıxarır.

Bəzi müəlliflərin fikrincə, ekstremal faktorların təsiri zamanı hüceyrədə toplanan qeyri-üzvi və üzvi peroksidlər sərbəst radikalla oksid-

ləşmə reaksiyalarının sürətinin artmasına səbəb olurlar. Bunun da nəticəsində hüceyrədə reduksiya olunmuş məhsullar, o cümlədən membranın lipidləri intensiv surətdə oksidləşməyə məruz qalırlar. Hüceyrə komponentlərinin bu cür intensiv oksidləşmə proseslərindən qorunmasında hüceyrədaxili antioksidantların roluna xüsusi yer ayrılır (Vladimirov, 1982; Kasumov, 1983).

Artıq müəyyən edilmişdir ki, normada və müxtəlif stress faktorlarının təsiri zamanı orqanizmin AOA-nin öyrənilməsi, ümumiyyətlə, hüceyrənin funksional vəziyyəti haqqında qiymətli informasiya mənbəyi ola bilər (Qrişko, Sihikov, 2003; Nijnik, 2004). Ona görə də biz oksidləşdirici stressin və şoranlığın bir və ikiləpəli toxumların cücərməsinə, cücərtilərin köklərinin və yerüstü hissəsinin böyüməsinə və onların köklərinin AOA təsirini öyrənməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq.

Tədqiqatın obyektləri və metodikası. Tədqiqat obyektini kimi buğda və noxud toxumlarından istifadə edilmişdir. Adı çəkilən toxumların cücərməsi termostatda +25°C-də aparılmışdır.


Oksidləşdirici agent kimi ozon qazından və hidrogen peroksid məhlulundan istifadə edilmişdir. Birinci variantda toxumlar 18 saat müddətində 10^{-4} % H_2O_2 məhlulunda saxlanılmış, sonra distillə suyuna keçirilmişdir. İkinci variantda toxumlar 18 saat müddətində distillə suyunda isladılmış, sonra 3 saat müddətində qapalı mühitdə ozonla zənginləşdirilmiş hava mühitində saxlanılmışdır.

Kökləri 1-1,5 sm-ə çatan cücərtilər tədqiqatın məqsədindən asılı olaraq distillə suyuna və ya 0,1 M NaCl məhluluna keçirilmişdir. Bir həftə müddətində cücərtilərin köklərinin və yerüstü hissəsinin nisbi böyüməsi öyrənilmiş, 2 və 5-günlük cücərtilərin köklərinin AOA təyin edilmişdir.


Köklərin AOA təyin edərəkən H_2O_2 -lə induksiya olunan xemilyuminesensiya metodundan istifadə edilmişdir (Kasumov, Mustafayev, 1976). Bütün ölçmələr 3 təkrarda aparılmış və alınan nəticələr statistik cəhətdən işlənilmişdir.

Alınan nəticələr və onların müzakirəsi. Toxumların cücərməsinin fizioloji-biokimyəvi mexanizmlərinin öyrənilməsi həmişə tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir. Bu hər şeydən əvvəl onunla əlaqədardır ki, məhz ekstremal faktorların təsiri şəraitində toxumlardan normal cücərtilərin alınması və son nəticədə onların məhsuldarlığını müəyyən edən əsas amillərdən biri olaraq qalmaqdadır.

Bizim apardığımız tədqiqatların nəticələrindən aydın olur ki, H_2O_2 və ozon kimi güclü oksidləşdiricilərin təsiri zamanı buğda və noxud toxumlarının cücərməsi prosesində nəzərə çarpan dəyişikliklər baş verir. Belə ki, 18 saat müddətində 10^{-4} %-li H_2O_2 məhlulunda saxlanılmış buğda və noxud toxumlarının distillə suyunda və 0,1 M NaCl məhlulunda sonrakı cücərmə enerjisi kontrol variantla müqayisədə xeyli yüksək olur. Şəkil 1 və şəkil 2-dəki əyriyənin analizindən görünür ki, bu artım cücərmənin birinci sutkasından sonra həm distillə suyunda, həm də NaCl məhlulunda 12-15%-ə çatır. Cücərmənin sonrakı müddətində də oksidləşdiricilərin təsirinə məruz qalmış toxumlarda cücərmə enerjisinin yüksək olması nəzərə çarpır.



Şəkil 1. NaCl şoranlığı şəraitində H₂O₂ məhlulunun buğda toxumlarının cücərmə enerjisinə təsiri: 1-kontrol (distillə suyunda); 2-H₂O₂-lə işlənmiş toxumlar (distillə suyunda); 3-kontrol (0,1 M NaCl məhlulunda); 4 - H₂O₂ ilə işlənmiş toxumlar (0,1 M NaCl).



Şəkil 2. NaCl şoranlığı şəraitində ozonun buğda toxumlarının cücərmə enerjisinə təsiri: 1-kontrol (distillə suyu); 2-ozonla işlənmiş toxumlar (distillə suyunda); 3-kontrol (0,1 M NaCl məhlulunda); 4-ozonla işlənmiş toxumlar (0,1 M NaCl-da).

Şəkillərdəki ayrılardan görünür ki, hər iki variantda buğda toxumlarının cücərmə enerjisi noxud toxumları ilə müqayisədə daha yüksək olur.

Hidrogen peroksiddə işlənmiş buğda toxumlarının cücərmə enerjisi distillə suyunda cücərmənin 1-2-ci sutkasından sonra yüksək qiymətə çatdığı halda, NaCl məhlulunda cücərdilən buğda toxumlarında isə cücərmə enerjisinin yüksək həddi cücərmənin 3-cü sutkasından sonra müşahidə edilir. Əvvəlcədən 10⁻⁴ % H₂O₂ məhlulu ilə işlənmiş buğda toxumlarının distillə suyunda cücürməsi zamanı cücərmə enerjisinin kontrol variantla müqayisədə cücərmənin 1-2-ci sutkasından sonra maksimum qiymətə çatması müşahidə edilirsə (32%), duz variantında cücərmə enerjisinin daha çox artımı yalnız cücərmənin 4-cü sutkasından sonra nəzərə çarpır (28%). Beləliklə, bu seriya təcrübələrin nəticələrin-

dən məlum olur ki, H_2O_2 kimi oksidləşdiricinin təsiri zamanı kontrol variantda (distillə suyu) ilə cücərmənin 1-2-ci sutkasından sonra cücərmə enerjisinin artımı maksimum qiymətə çatdığı halda, NaCl şoranlığı şəraitində cücərdilən toxumlarda isə cücərmə enerjisinin maksimum artımı cücərmənin 4-cü sutkasından sonrakı müddətə təsadüf edilir. 2-ci şəkildə ozonun buğda toxumlarının cücərmə enerjisinə təsirini əks etdirən əyriyə verilmişdir. Əyriyənin analizi göstərir ki, 3 saat müddətində ozon qazının təsirinə məruz qalan buğda toxumlarının həm distillə suyunda, həm də NaCl məhlulunda cücərmə enerjisi kontrol variantla müqayisədə xeyli yüksək olur. Belə ki, cücərmənin 1-ci sutkasından sonra bu artım maksimum qiymətə çataraq distillə suyunda 52% NaCl məhlulunda isə 41% təşkil edir.

Noxud toxumları ilə aparılan təcrübələrdən alınan nəticələr identik olsa da, ümumən həm distillə suyu, həm də NaCl məhlulu variantlarında buğda toxumlarının cücərmə enerjisi noxud toxumlarına nisbətən yüksək olur.

Sonrakı seriya təcrübələrdə H_2O_2 və ozon kimi oksidləşdiricilərin normada və NaCl şoranlığı şəraitində buğda və noxud cücərtilərini köklərinin və gövdələrinin nisbi böyüməsinə təsiri öyrənilmişdir. Aparılan təcrübələrin nəticələrindən məlum olur ki, oksidləşdiricilərin təsirinə məruz qalmış toxumlardan alınan buğda və noxud cücərtilərini köklərinin və gövdələrinin böyüməsində stimullaşma nəzərə çarpır. Belə ki, buğda toxumlarında cücərmənin 4-cü və 5-ci günündə kontrol variantla müqayisədə bu artım köklərdə 70-80%-ə, gövdədə isə 55-60%-ə çatır. Belə bir qanunauyğunluq nisbətən aşağı faizlə noxud cücərtilərini köklərində və gövdəsində də nəzərə çarpır.

Sonra biz H_2O_2 məhlulunun və ozon qazının 2 və 5 günlük buğda və noxud cücərtilərini köklərinin AOA təsirini öyrənmişik. Aparılan təcrübələrin nəticələrindən məlum olmuşdur ki, 2 günlük buğda və noxud cücərtilərini köklərində AOA həm kontrol variantda, həm də NaCl şoranlığı şəraitində 5-günlük cücərtilərini köklərinə nisbətən daha yüksək olur. NaCl məhlulunda becərilən cücərtilərini kökləri daha aşağı AOA-lə xarakterizə olunurlar. Hidrogen peroksid məhlulu və ozon qazı ilə işlənmiş toxumlardan alınan cücərtilərini köklərində AOA azalması daha kəskin xarakter daşıyır. Belə ki, ozonun təsirinə məruz qalmış noxud toxumlarından alınmış 5-günlük cücərtilərini köklərində AOA kontrol variantla müqayisədə 2,2 dəfə azalır. Ancaq cücərmənin 2-ci günündən sonra noxud cücərtilərini köklərində AOA azalması təxminən 70-80% olur. Təcrübənin nəticələrindən aydın olur ki, H_2O_2 məhlulu və ozon qazı ilə yanaşı köklərin AOA azalmasına NaCl duzu da güclü təsir göstərir. Ümumiyyətlə, bütün variantlarda buğda cücərtilərini kökləri noxud cücərtiləri ilə müqayisədə daha aşağı AOA-lə xarakterizə olunur. Ancaq təcrübələrdə istifadə edilən oksidləşdiricilərin və NaCl duzunun təsiri altında köklərin AOA azalması buğda cücərtilərini nisbətən noxud cücərtilərində daha kəskin xarakter daşıyır.

Aparılan tədqiqatlardan məlum olur ki, iki və beş günlük cücərtilərini köklərindən alınmış homogenatın H_2O_2 -lə induksiya olunan xemilyuminissensiyasının kinetikasi bir maksimumlu əyri ilə səciyyələnir. Ancaq 2-günlük cücərtilərini kökləri 5-günlük cücərtilərlə müqayisədə daha intensiv xemilyuminissensiyaya malik olurlar.

Yuxarıda deyilənlərə yekun vuraraq qeyd etmək lazımdır ki, ətraf mühidə duzların qatılığının yüksəkliyi və güclü oksidləşdiricilərin işti-

rakı bitkilərdə fizioloji-biokimyəvi proseslərin normal gedişində müəyyən gərginliklər əmələ gətirir ki, bunlar da son nəticədə həmin stress faktorlarının təsiri altında bitkilərdə metabolizmin pozulmasına səbəb olur.

ƏDƏBİYYAT

1. Владимиров Ю.А. Свободные радикалы в первичных фотобиологических процессах // Биол. мембраны, 1982, 15, №5, с.517-525.
2. Касумов Н.А. Физиолого-биологические механизмы действия солей на растительный организм. Баку. 1983, 143 с.
3. Грищенко В.М., Сишиков Д.В. Влияние кадмия на функционирование глутатионзависимой антиоксидантной системы у гороха и сои // Докл. Нац. АН Укр., 2003, №11, с.171-178.
4. Касумов Н.А., Мустафаев С.И. Определение антиокислительной активности растительной ткани / В кн.: Антиоксиданты в норме и при патологии. М.: Наука, 1976, с.76-78.
5. Нижник Т.П., Григорюк И.П. Интенсивность перекисного окисления липидов, и активность антиоксидантных ферментов в листьях картофеля в условиях засухи и при действии полистимулина // Укр. биохим. ж. 2004, 76, №1, с.130-135.

ДЕЙСТВИЕ ОЗОНА И ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА НА АНТИОКСИДТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КОРНЕЙ ПРОРОСТКОВ В НОРМЕ И В УСЛОВИЯХ ХЛОРИСТОГО ЗАСОЛЕНИЯ

С.И.МУСТАФАЕВ, Н.А. КАСУМОВ

РЕЗЮМЕ

Изучено действие озона и раствора H_2O_2 в норме и при засолении субстрата с NaCl на процесс прорастания, рост корней, надземной части и антиокислительную активность корней проростков пшеницы и гороха.

Установлено, что в норме и при засолении субстрата под действием озона и H_2O_2 ускоряется процесс прорастания семян, рост корней и надземной части проростков пшеницы и гороха. Антиокислительная активность корней проростков полученных из обработанных семян с озоном и H_2O_2 заметно снижается, в условиях засоления снижения антиокислительной активности носит более резкий характер.

THE INFLUENCE OF OZONE AND HYDROGEN PEROXIDE ON ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF THE GERUND ROOTS IN NORM AND IN CONDITION OF CHLOROUS SALINIZATION

S.I.MUSTAFAYEV, N.A.GASIMOV

SUMMARY

In was studied that the influence of ozone and H_2O_2 solution in norm and in salinization of substratum with NaCl on process of germination, height of roots, the top and antioxidative activitu of germ roots of wheat and pea.

It was determined that in norm and salinization of substratum under the influence of ozone and H_2O_2 the process of germination of seeds, height of roots and the top of wheat and pea germs is hastened. Antioxidative activity of germ roots obtained from investigated seeds with ozone and H_2O_2 is decreased, in condition of salinization the decreasing of antioxidative activity has more strict character.