

**AZƏRBAYCANIN TERMAL SULARINDA AKTİNOMİSETLƏRİN
YAYILMASI VƏ ONLARIN NÖV TƏRKİBİ**

F.R.ƏHMƏDOVA
Bakı Dövlət Universiteti

Tədqiqatda Azərbaycanın ərazisində yerləşən termal sularda aktinomisetlərin yayılması öyrənilmiş və məlum olmuşdur ki, həmin termal sularda əsasən Thermoactinomyces diastaticus (43 ştam) və Thermomicromonospora vulgaris (17 ştam) növləri dominantlıq təşkil edirlər.

Termal suların səciyyəvi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq aktinomisetlərin miqdarca və keyfiyyətə yayılması nəzərə çarpacaq dərəcədə müxtəlifdir.

Termofil aktinomisetlər də digər mikroorqanizmlər kimi təbiətdə geniş yayılmış və onların katabolit reaksiyalarında iştirak etmələri bu imkanı artırır. Aktinomisetlər müxtəlif substratlarda, torpaqda, suda, müxtəlif süd məhsullarında təsadüf olunsada, termal sularda və müalicəvi palçıqlarda nisbətən geniş yayılmışlar [8,10].

Termal suların məhsuldarlığında aktinomisetlərin böyük əhəmiyyəti vardır, onlar güclü ferment sisteminə malik olduqları üçün müxtəlif üzvi birləşmələrin parçalanmasında, qida maddələri mübadiləsində stimuleedici və tormozlayıcı təsir göstərərək mühitdə digər mikroorqanizmlərin inkişafına əlverişli şərait yaradırlar [9].

Bütün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycanın ayrı-ayrı zonalarında formalaşan və səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə bir-birindən fərqlənən termal sularda ilk dəfə olaraq aktinomisetlərin müqayisəli tədqiqi aparılmışdır [2, 3, 4].

TƏDQIQATIN OBYEKTİ VƏ METODU

Tədqiqatda Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Dağlıq Talış zonalarının ayrı-ayrı ərazilərində yerləşən termal su mənbələrindən nümunələr toplanmış və ümumi metodla mikrobioloji analiz olunmuşdur [7].

Aktinomisetlərin tədqiqi zamanı səthi becərmə üsulundan və əsasən Vaksman, Qauze - 1, Çapek-Doks (saxaroza əlavə olunmaqla) qidalı mühitlərindən istifadə olunmuşdur. Aktinomisetlərin identifikasiyası L.Q.Loqinovanın monoqrafiyalarına və ayrı-ayrı təyinedicilərə əsasən aparılmışdır [1, 5, 6].

TƏDQIQATIN TƏHLİLİ

Azərbaycanın Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Dağlıq Talış zonalarının termal sularında aktinomisetlərin müqayisəli öyrənilməsi göstərdi ki, Kiçik Qafqazın tədqiq olunan termal sularında aktinomisetlərin heç bir növünə təsadüf olunmamışdır. Görünür, həmin suların tərkibində mərgümüşün yüksək miqdarı onların inkişafına tormozlayıcı təsir

göstərmişdir. Kiçik Qafqazdan fərqli olaraq Böyük Qafqazın və Dağlıq Talışın termal sularında isə aktinomisetlərə təsadüf olunur. Aktinomisetlər üçün Qauze -1 qidalı mühitinin daha əlverişli olmasını nəzərə alaraq, alınan nəticələr cədvəldə yalnız həmin qidalı mühitdə təsvir edilmişdir (Cədvəl 1).

Cədvəldən görüldüyü kimi Böyük Qafqaz ərazisində toplanmış termal suların temperaturu əsasən nisbətən aşağı olub, 35,5-48⁰C-yə bərabərdir. Qələvi xassəli bu suların (pH=7,3-9,0) minerallaşmasında da zəiflik özünü göstərir (0,9-1, 9q/l). Lakin Böyük Qafqazın qurtaracağına, Abşeron yarımadasında yerləşən, qələvi xassəli (pH=9,0) Şıx termal suyu həm temperaturunun (65⁰), həm də minerallaşmasının yüksəkliyi ilə fərqlənir (14, 8,9q/l).

Cədvəl 1

Böyük Qafqazın və Dağlıq Talışın termal sularında aktinomisetlərin yayılması və növ tərkibi
(Qauze-1 qidalı mühitində, 50⁰C-də, becərilmə müddəti 14 sutka)

№	Su mənbələrinin adları və yerləşdikləri coğrafi rayonlar	Suyun temperaturu t ⁰ C	pH	Minerallaşması q/l-lə	Aktinomisetlərin ümumi miqdarı 1 ml-də min hesabı ilə	Thermoactinomyces diastaticus	Thermomicromonospora vulgaris
						Onlardan ayrılan ştammlar	
Böyük Qafqaz							
1.	Quba r-nu; Xaşi	37,5	8,1	1,2	4	21, 23, 31, 18	-
2.	Xaltan-1	48	8,5	1,5	1	-	29
3.	Xaltan-2	47	8,0	1,1	2	38	40
4.	Cimi-1	43	7,7	0,9	2	48,51	-
5.	Cimi-2	35,5	7,8	1,1	5	13,15,19,20,30	-
6.	Qax r-nu; Oğlanbulaq	41	8,1	1,3	2	24, 27	-
7.	Qızbulaq	39	8,1	1,4	2	14,16	-
8.	Oğuz r-nu Bum	40	7,4	1,7	2	22, 25	-
9.	Xalxal	30	7,5	0,9	6	4,6,8, 9, 10,12	-
10.	Qəbələ r-nu; Qəmərvan	40,5	7,3	1,7	3	2, 11, 17	-
11.	Şamaxı r-nu; Çaqan	32,5	7,5	1,9	6	3,34,36,38,39,40	-
12.	Abşeron yarım-sı ;Şıx	65	9,0	14,89	1	-	1
Dağlıq Talış; Masallı rayonu							
13.	Baş Ərkəvan	64	6,2	17,0	-	-	-
14.	Qotursu	63	7,85	14,0	2	-	23,20
15.	Donuzutan	64	7,45	16,0	3	-	10,11,12
16.	Mışarçay	45	6,6	10,8	-	-	-
Lənkəran rayonu							
17.	Yuxarı Lənkəran	43	6,7	3,4	-	-	-
8.	Aşağı Lənkəran	45	6,7	3,6	-	-	-
19.	Qəvzəvua (6 saylı quyu)	42	6,0	3,46	-	-	-
20.	Xavt-Xoni (1 say.bulaq)	40	7,1	5,2	7	1,2,5,8,13,14,16	-
21.	Meşəsu (1 saylı bulaq)	46	7,1	5,2	6	15,19,20,21,22,23	-
22.	Meşəsu (1k saylı bulaq)	42	7,6	3,8	6	25,29,30,31,32,34	-
Astara rayonu							
23.	Alaşa-1	60	7,0	9,8	-	-	-
24.	Alaşa-2	70	7,4	19,0	-	-	-

Termal suların səciyyəvi xüsusiyyətləri onların mikrobiotasına, orada inkişaf edən aktinomisetlərin sayına və növ tərkibinə öz təsirini göstərmişdir.

Termal sularında aktinomisetlərin miqdarı bakteriyalarla müqayisədə olduqca azlıq təşkil edirlərsə də, cədvəldən görüldüyü kimi, hər halda müəyyən miqdarda müşahidə olunurlar (36 ştammlar). Onların cins tərkibi də qanunauyğun olaraq sadəliyi ilə nəzərə çarpır və bunun əsas səbəbi suyun temperaturunun yüksək olmasıdır. Belə ki, suyun temperaturu artdıqca, mühitdə yaşayan mikroorqanizmlərin miqdarı azalır, növ tərkibi isə sadələşir və bu zaman onların təmiz kulturasını almaq da asanlaşır.

Cədvəldən görüldüyü kimi, *Thermoactinomyces diastaticus* növünə aid ştammlar nisbətən aşağı temperaturlu (33 ştammlar), *Thermomicromonospora vulgaris* növünə aid ştammlar (3 ştammlar) isə nisbətən yüksək temperaturlu sularda dominantlıq təşkil edir.

Dağlıq Talış ərazisinin termal sularında aktinomisetlərin yayılmasına gəldikdə, cədvəldə təsvir edildiyi kimi, burada Masallı, Lənkəran və Astara rayonlarının ərazilərində formalaşan termal sular öz aralarında səciyyəvi xüsusiyyətlərinin rəngarəngliyi ilə fərqləndikləri kimi, Böyük Qafqazın termal sularından da kəskin fərqlənirlər. Bu fərq eyni zamanda mikrobiotanın da formalaşmasında aydın nəzərə çarpır.

Termofil aktinomisetlərə zəif qələvi xassəli Qotursu (65⁰, pH=7,8), Donuzutan (65⁰, pH=7,45), Xavt-Xoni (40⁰, pH=7,1), Meşəsu (46⁰, pH=7,1), Meşəsu -1к (42⁰, pH=7,6) termal sularında təsadüf olunmuşdur (cədvəl). Lakin Dağlıq Talışın tədqiq olunan turş xassəli termal sularında aktinomisetlərin heç bir növünü müşahidə etmək mümkün olmamışdır (Baş Ərkəvan, Mişarçay, Yuxarı Lənkəran, Aşağı Lənkəran, Qəvzəvua). Astara rayonunun termal sularında aktinomisetlərin müşahidə olunmaması, çox güman ki, mineralaşmanın və temperaturun həmin sularda yüksəkliyi ilə əlaqədardır.

Dağlıq Talışın termal sularında ümumilikdə 24 sayda aktinomiset ştammi ayrılmış, onlar morfoloji-kultural əlamətlərinə və fizioloji xüsusiyyətlərinə əsasən *Thermoactinomyces diastaticus* (10 ştammlar) və *Thermomicromonospora vulgaris* (14 ştammlar) növlərinə aid olunmuşdur.

Cədvəldən görüldüyü kimi, *Thermomicromonospora vulgaris* növü yalnız yuxarı temperaturlu, *Thermoactinomyces diastaticus* növü isə nisbətən aşağı temperaturlu sularda müşahidə olunmuşdur.

Azərbaycanın termal sularından ayrılmış termofil aktinomisetlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri barədə aşağıda məlumatlar verilir:

***Thermoactinomyces diastaticus* (Bergey, 1919)**

(2, 3, 4, 6, 8, 29, 32, 48 sayılı ştammlar)

Hüceyrələrin morfolojiyası. Hava mitselilərinə malikdir, ölçüləri 1,2 - 1,5x0,6 - 0,7 мк-ə bərabərdir. Spordaşıyanları qıvrımlı olub, 1 - 3 buğumdan ibarətdir. Sporları oval formalıdır, zəncirvari düzülür.

Koloniyanın quruluşu. Qauze-1 qidalı mühitində üzəri nahamar, kənarı girintili-çıxıntılı, hava mitseliləri cəhrayı, substrat mitseliləri isə bozumtul-ağdır. Mühiti boz rəngə boyayır. Aralarında substrat mitselisi sarımtıl-açıq rəngli onlanlara da təsadüf olunur.

Temperatura münasibəti: Optimal 45 - 50⁰C, maksimal 55 - 60⁰C, minimal 35 - 40⁰C-dır.

Oksigenə münasibətinə görə aerobdur.

Qida maddələrinə münasibəti. Qlükozanı, maltozanı, qalaktozanı, saxarozanı, mannozanı asanlıqla mənimsəyirlər. Ətli-peptonlu aqarda zəif inkişaf edirlər. Üzvi azot mənbələrindən sidik cövhərini, qlütamini, asparaqini, qeyri-üzvi azot mənbəyindən $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -ü asanlıqla mənimsəyirlər. Jelatini sıyıqlaşdırır, nişastanı hidroliz edirlər. H_2S əmələ gətirmirlər.

***Thermomicromonospora vulgaris* (Tsiklinsky, Waksman, 1929) (1, 26 19, 40, 4, 42, 20d, 23d sayılı ştammlar)**

Hüceyrələrin morfoloqiyası. Hava və substrat mitseliləri yaxşı inkişaf etmişdir. Konidilərin üzərində spordaşıyanlar formalaşır və spordaşıyanların ölçüləri 0,5 x 5 mк-a bərabərdir. Sporları oval formalıdır.

Koloniyaların quruluşu. Qauze-1 bərk qidalı mühit üzərində boz ağımtıl rənglidir, kənara girintili-çıxıntılı olub, qidalı mühitə daxil olur. Qidalı mühiti boz rəngə boyayır. Aralarında qidalı mühiti qara rəngə boyayan növlərə də təsadüf olunur.

Oksigenə münasibətinə görə aerobdur.

Qida maddələrinə münasibəti. Qauze qidalı mühitində yaxşı, ətli-peptonlu aqarda zəif inkişaf edir. Saxarozanı, laktozanı, sorbiti karbon mənbəyi kimi, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -ü azot mənbəyi kimi yaxşı mənimsəyir. Jelatini sıyıqlaşdırır, nişastanı hidroliz edir və südü peptonlaşdırır. Nitratları nitritlərə bərpa edir. Sellülozanı fəal parçalayır.

Temperatura münasibəti. Optimal 45-55°C, maksimal 65°C, minimal 40°C-dir.

Beləliklə, Böyük Qafqazın, Kiçik Qafqazın və Dağlıq Talışın termal sularının müqayisəli öyrənilməsi göstərdi ki, Böyük Qafqazın və Dağlıq Talışın termal suları termofil aktinomisetlərin inkişafı üçün daha əlverişlidir, Kiçik Qafqazın termal sularında aktinomisetlərin heç bir növünə təsadüf olunmamışdır.

Termal sular öz hidrogeokimyəvi xüsusiyyətlərinə görə fərqləndikləri kimi, mikrobiotasının tərkibinə görə də bir-birindən kəskin fərqlənirlər. Xüsusilə suyun temperaturunun yüksəlməsi, orada yaşayan mikroorqanizmlərin miqdarına və növ tərkibinə güclü təsir göstərir.

ƏDƏBİYYAT

1. Агре Н.С. Систематика термофильных актиномицетов // В кн. Биология термофильных микроорганизмов. М.Наука, 1986. с.47-57.
2. Аскеров А.Г. Перспективы использования гидротермальных источников Азербайджана // ценные записки Азгосуниверситета, Баку, 1962, №2, с.13-22.
3. Асланов А.Д. Гидрогеологические условия формирования и закономерности распространения гидротерм Южного склона Большого Кавказа (в пред. Азерб ССР). Автореферат на соиск уч. степ. к.г.-м., Баку, 1971, 27 с.
4. Бабаев А.М., Исмаилов М.М. Роль гидротермических факторов в формировании гидротермических ресурсов Талыша // Уч. Записки АГНА, Баку, 1997, №4, с. 23-29.
5. Космачев А.Е. Значение термофильности при классификации актиномицетов // Микробиология, 1956, Т. 25, в. 6 с.938.
6. Красильников Н.А. Определитель бактерий и актиномицетов. М. –Л. Изд.АН СССР., 1949, 830 с.
7. Кузнецов С.И., Дубинина Г.А. Методы изучения водных микроорганизмов // М., Наука, 1989, 288 с.

8. Логинова Л.Г., Головачева Р.С., Егорова Л.А. Жизнь микроорганизмов при высоких температурах. М., Наука, 1966, 294 с.
9. Тулемисова А., Мамонтова Л.П., Бекмаханова Н.Е. Термофильная микроорганизмы Южного Казахстана. Алма-Ата, Наука, 1984, 157 с.
10. Takai K. Hydrothermal vents; biodiversity in deep-sea hydrothermal vents // Encyclopedia of environmental microbiology. New York; John Wiley and Sons, 2002, p. 1604-1616.

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВИДОВОЙ СОСТАВ АКТИНОМИЦЕТОВ
В ТЕРМАЛЬНЫХ ВОДАХ АЗЕРБАЙДЖАНА**

Ф.Р.АХМЕДОВА

РЕЗЮМЕ

В сравнительном микробиологическом исследовании на территории Большого Кавказа, Малого Кавказа и Горного Талыша Азербайджана, было выявлено, что актиномицеты обнаружены в основном в термальных водах Большого Кавказа и Горного Талыша и они отнесены к видам *Thermoactinomyces diastaticus* и *Thermomicromonospora vulgaris*. В термальных водах Малого Кавказа никаких видов актиномицетов не наблюдалось.

**THE SPREAD AND SPECIES OF ACTINOMYCETES IN THE
THERMAL WATERS OF AZERBAIJAN**

F.R.AKHMEDOVA

SUMMARY

In the comparative microbiological investigation on the territory of Big Caucasus, Small Caucasus and Mountainous Talish of Azerbaijan there was revealed that actinomycetes were mainly found in the thermal waters of Big Caucasus and Mountainous Talish and they are related to the species *Thermoactinomyces diastaticus* and *Thermomicromonospora vulgaris*. In the thermal waters of Small Caucasus no species of actinomycetes were found.