

KİMYA


5,5-DİMETİLHEKSANDİON-1,3-ÜN 1,2-EPOKSI-3-XLORPROPANLA
ƏMƏLƏ GƏTİRDİYİ O-ALKİLLƏŞMƏ MƏHSULUNUN BƏZİ
AMİNLƏRLƏ ÇEVİRİLMƏ REAKSİYASININ TƏDQIQIA.M.MƏHƏRRƏMOV, F.N.NAĞIYEV, İ.Q.MƏMMƏDOV,
N.M.ALLAHVERDİYEV, İ.Ə.ƏLİYEV, M.Ə.ALLAHVERDİYEV

Bakı Dövlət Universiteti

E-mail: FNNorgsynthes@yahoo.com.


Dimedonun K_2CO_3 iştirakında DMSO mühitində 1,2-epoksi-3-xlorpropanla alkəlləşmə reaksiyasından alınmış O-alkəlləşmə məhsulunun bəzi aminlərlə çevrilmə reaksiyası aparılmış və müvafiq aminospirotlər- 1-(N-2'-metilfenilamino)-3-O-(4',4'-dimetilsikloheksen-1-on-6-propanol-2, 1-(N-4'-bromfenilamino)-3-O-4',4'-dimetilsikloheksen-1-on-6-propanol-2, 1-dibutilamino-3-O-4',4'-dimetilsikloheksen-1-on-6-propanol-2, 1-amino-3-O-4',4'-dimetilsikloheksen-1-on-6-propanol-2, 1-metil-amino-3-O-4',4'-dimetilsikloheksen-1-on-6-propanol-2, 1-(N-etilendiamino)-3-O-4',4'-dimetilsikloheksen-1-on-6-propanol-2 və 1-asetilamino-3-O-4',4'-dimetilsikloheksen-1-on-6-asetiloksipropan-2 sintez edilmişdir.

Müxtəlif əsasi mühitlərin istifadəsi ilə metilen aktiv birləşmələrin bəzi alkil halogenidlərlə alkəlləşmə (C-, O- və ya C-O) və alınan məhsulların çevrilmə reaksiyalarının tədqiqinə bir çox elmi tədqiqat işlərində rast gəlinir [1-5]. Metilen aktiv birləşmələrin bifunksional heterotsikl olan 1,2-epoksi-3-xlorpropanla alkəlləşmə reaksiyalarına ədəbiyyatda çox az rast gəldiyindən bu reaksiyanın tədqiqi marağımıza səbəb oldu. Biz bundan əvvəlki işlərimizdə bəzi metilen aktiv birləşmələrlə 1,2-epoksi-3-xlorpropanın alkəlləşmə reaksiyası və alınan birləşmələrin çevrilmələrini tədqiq etmişik [6]. Oxucuların nəzər diqqətinə çatdırılan işdə yenə də tərəfimizdən ilk dəfə olaraq, metilen aktiv birləşmə olan 5,5-dimetilheksandion-1,3-ün 1,2-epoksi-3-xlorpropanla DMSO mühitində, əsas kimi K_2CO_3 iştirakında alkəlləşmə reaksiyasından O-alkəlləşmə məhsulu(I) sintez edilmişdir:




Elmi ədəbiyyatdan [7,8] epoksi halqa saxlayan birləşmələrin aminlərlə müvafiq aminospirotlərin alınması ilə gedən reaksiyaları məlumdur.

Sintez edilən 3-(1',2'-epoksipropiloksi)-5,5-dimetilsikloheksen-2-1-onun (I) C_2H_5OH və su mühitlərində bəzi aminlərlə çevrilmə reaksiyaları aparılmışdır:



Əmələ gələn aminospirot- 1-amino-3-O-4',4'-dimetilsikloheksen-1-on-6-propanol-2 asetilxloridlə asilləşdirilmişdir:



Sintez edilmiş birləşmələrin (I-III) quruluşu İQ və ^1H , ^{13}C NMR spektroskopiyasının köməyi ilə təsdiq edilmişdir.

TƏCRÜBİ HİSSƏ

İQ spektrləri «Spekord 75-İR» cihazında maye təbəqədə, ^1H , ^{13}C NMR spektrləri isə Bruker 300 spektrometrində (300; 75MHz) çəkilmişdir. Birləşmələrin təmizliyi nazik təbəqəli xromatoqrafiya ilə təsdiqlənmişdir. Nazik təbəqəli xromatoqrafiya Silufol UV-254 lövhəsində aparılmışdır.

1-(N-2'-Metilfenilamino)-3-O-4',4'-dimetilsikloheksen-1-on-6-propanol-2. Yastıdıbli kolbaya 2q (0,01mol) 3-(1',2'-epoksipropiloksi)-5,5-dimetilsikloheksen-2-1-on, 2,5q (0,023mol) o-toluidin və 15ml C_2H_5OH əlavə edilərək, 70-75°C temperatur intervalında 15 saat müddətində maqnit qarışdırıcı ilə qarışdırılır. Reaksiya qarışığındakı C_2H_5OH qovulur. Qalan qalıq əvvəlcə maye, bir az keçdikdən sonra isə kristal hala çevrilir. Alınan kristallar CCl_4 -lə yuyulub, süzücü qıfndan süzülür.

^1H NMR spektr. (DMSO- d_6 , δ , m.h.): 1,0 (s, 6H, 2 CH_3); 2,05 (s, 3H, $\text{H}_3\text{C-Ar}$); 2,29 və 2,52 (s, 4H, 2 CH_2); 3,19 (m, 2H, NCH_2); 3,41 (s, 1H, OH); 3,90 (d, 2H, OCH_2); 3,88 (s, 1H, NH); 4,79 (m, 1H, HC-O); 5,3 (s, 1H, =CH); 6,48-6,99 (4H, Arom.). ^{13}C NMR spektr. (DMSO- d_6 , δ , m.h.): 18.72, 28.98, 32.25, 42.95, 46.58, 51.93, 67.21, 71.63, 102.11, 109.98, 117.12, 122.84, 127.13, 130.05, 147.23, 177.18, 198.84.

1,95q 1-(N-2'-Metilfenilamino)-3-O-(4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-propanol-2 alınır. Çıxım 63,1% təşkil edir. $T_{ar}=145^{\circ}C$. $R_f=0,38$ (elyuent – qeptan: izopropil spirti 3:1).

1-(N-4'-Bromfenilamino)-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-propanol-2. Yastıdıbli kəlbaya 1,4q (0,0071mol) 3-(1',2'-epoksi-propiloksi)-5,5-dimetiltsikloheksen-2-1-on, 1,2q (0,0071mol) p-bromanilin, 20ml C_2H_5OH və 15ml distillə suyu əlavə edilərək, $70-75^{\circ}C$ temperatur intervalında 10 saat müddətində maqnit qarışdırıcı ilə qarışdırılır. Reaksiya qarışığındakı C_2H_5OH qovulur. Qalan sulu qalıq dixlormetanla ekstraksiya edilir. Alınmış ekstrakt Na_2SO_4 -lə qurudulur. Ekstraktdan CH_2Cl_2 qovulur. Yerdə çox özülü hissə qalır.

1H NMR spektr. (DMSO-d6, δ , m.h.): 0,99 (s, 6H, $2CH_3$); 2,11 (s, 2H, CH_2); 2,28 (s, 2H, CH_2); 2,51 (s, 1H, OH); 3,62 (m, 2H, NCH_2); 3,90 (m, 1H, HC-O); 3,99 (d, 2H, OCH_2); 5,34 (s, 1H, =CH); 5,72 (s, 1H, NH); 6,59-7,19 (4H, Arom.). ^{13}C NMR spektr. (DMSO-d6, δ , m.h.): 28.32, 33.12, 42.21, 42.55, 50.09, 67.05, 71.04, 102.14, 106.18, 114.98, 131.96, 148.36, 166.03, 196.95.

1,5q 1-(N-4'-Bromfenilamino)-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-propanol-2 alınır. Çıxım 57,69% təşkil edir. $R_f=0,48$ (elyuent – heksan: etil spirti 1:2).

1-Dibutilamino-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-propanol-2. Yastıdıbli kəlbaya 2,4q (0,0122mol) 3-(1',2'-epoksi-propiloksi)-5,5-dimetiltsikloheksen-2-1-on, 2,1q (0,0163mol) dibutilamin, 20ml C_2H_5OH və 15ml distillə suyu əlavə edilərək, $70-75^{\circ}C$ temperatur intervalında 10 saat müddətində maqnit qarışdırıcı ilə qarışdırılır. Reaksiya qarışığı dixlormetanla ekstraksiya edilir. Alınmış ekstrakt Na_2SO_4 -lə qurudulur. Ekstraktdan dixlormetanı qovduqda az maddə qalır. Ekstraksiyadan qalan sulu qalığı su hamamında qızdırmaqla, əvvəlcə su nasosu ilə qarışıqda olan su, sonra isə vakkumda reaksiyaya girməyən dibutilamin distillə edilir. Qalan qalıq çox özülüdür, distillə edilə bilmir.

1H NMR spektr. (DMSO-d6, δ , m.h.): 0,85 (t, 6H, $2CH_3$); 0,97 (s, 6H, $2CH_3$); 1,31 (m, 8H, $4CH_2$); 2,09 (s, 2H, CH_2); 2,28 (s, 2H, CH_2); 2,22 (s, 1H, OH); 2,54 (m, 6H, $N(CH_2)_3$); 3,79 (m, 1H, HC-O); 3,9 (d, 2H, OCH_2); 5,25 (s, 1H, =CH). ^{13}C NMR spektr. (DMSO-d6, δ , m.h.): 14.10, 20.04, 28.21, 32.15, 41.58, 42.50, 54.09, 56.90, 66.53, 71.11, 102.01, 168.95, 196.66.

2,5q 1-Dibutilamino-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-propanol-2 alınır. Çıxım 62,8% təşkil edir. $R_f=0,51$ (elyuent – heksan: etil spirti 1:2).

1-Amino-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-propanol-2. Yastıdıbli kəlbaya 5q (0,026 mol) 3-(1',2'-epoksi-propiloksi)-5,5-dimetiltsikloheksen-2-1-on, 20ml NH_4OH -in suda məhlulu (0,11mol), 15ml C_2H_5OH əlavə edilərək, $70-75^{\circ}C$ temperatur intervalında 10 saat müddətində maqnit qarışdırıcı ilə qarışdırılır. Reaksiya qarışığı su hamamında qızdırmaqla, su nasosu ilə qarışıqda olan su qovulur. Qalan qalıq çox özülüdür, distillə edilə bilmir.

1H NMR spektr. (DMSO-d6, δ , m.h.): 0,93 (t, 6H, $2CH_3$); 1,94 (s, 2H, CH_2); 2,21 (s, 2H, CH_2); 2,89-3,12 (dd, 2H, NCH_2); 3,34 (d, 2H, OCH_2); 3,65 (m, 1H, HC-O); 4,39 (s, 2H, OH, NH); 4.89 (s, 1H, =CH).

^{13}C NMR spektr. (DMSO-d₆, δ , m.h.): 28.33, 33.01, 41.87, 46.45, 51.02, 63.96, 69.99, 93.93, 165.01, 194.99.

4,9q 1-Amino-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-propanol-2 alınır. Çıxım 90,2% təşkil edir. Rf= 0,42 (elyuent – heksan: izopropil spirti 1:1).

1-Metilamino-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-propanol-2.

Yastıdib kəlbaya 3q (0,0153mol) 3-(1',2'-epoksi-propiloksi)-5,5-dimetiltsikloheksen-2-1-on, 20ml CH_3NH_2 -in suda məhlulu (0,13mol), 15ml $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ əlavə edilərək, 70-75°C temperatur intervalında 10 saat müddətində maqnit qarışdırıcı ilə qarışdırılır. Reaksiya qarışığı su hamamında qızdırmaqla, su nasosu ilə qarışıqda olan su qovulur. Qalan qalıq çox özülüdür, distillə edilə bilmir.

^1H NMR spektr. (DMSO-d₆, δ , m.h.): 0,95 (t, 6H, 2 CH_3); 1,91 (s, 2H, CH_2); 2,31 (s, 2H, CH_2); 2,38 (s, 1H, OH); 2,49 (s, 3H, CH_3); 2,82 (m, 2H, NCH_2); 3,41 (d, 2H, OCH_2); 3,61 (m, 1H, HC-O); 3,79 (s, 2H, NH); 4,88 (s, 1H, =CH). ^{13}C NMR spektr. (DMSO-d₆, δ , m.h.): 28.56, 33.74, 34.02, 43.85, 50.01, 52.81, 64.76, 67.05, 84.01, 95.99, 170.00, 194.70.

2,5q 1-Metilamino-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-propanol-2 alınır. Çıxım 72,5% təşkil edir. Rf= 0,27 (elyuent – heksan: izopropil spirti 1:1).

1-(N-Etilendiamino)-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-propanol-2. Yastıdibli kəlbaya 2,4q (0,0122mol) 3-(1',2'-epoksi-propiloksi)-5,5-dimetiltsikloheksen-2-1-on, 2q (0,033mol) etilendiamin, 15ml $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ və 10ml distillə suyu əlavə edilərək, 70-75°C temperatur intervalında 10 saat müddətində maqnit qarışdırıcı ilə qarışdırılır. Reaksiya qarışığı dixlormetanla ekstraksiya edilir. Alınmış ekstrakt Na_2SO_4 -lə qurudulur. Ekstraktan dixlormetanı qovduqda az maddə qaldı. Ekstraksiyadan qalan sulu qalıq su hamamında qızdırmaqla, əvvəlcə su nasosu ilə qarışıqda olan su sonra isə vakuunda reaksiyaya girməyən etilendiamin distillə edilir. Qalan qalıq çox özülüdür, distillə edilə bilmir.

^1H NMR spektr. (DMSO-d₆, δ , m.h.): 0,93 (t, 6H, 2 CH_3); 1,92 (s, 2H, CH_2); 2,19 (s, 2H, CH_2); 2,61 (m, 2H, 2 NCH_2); 3,04 (m, 2H, NCH_2); 3,30 (d, 2H, OCH_2); 3,51 (m, 1H, HC-O); 4,09 (s, 4H, OH, NH, NH_2); 4,82 (s, 1H, =CH). ^{13}C NMR spektr. (DMSO-d₆, δ , m.h.): 28.41, 33.96, 42.48, 42.97, 47.64, 50.55, 52.98, 64.97, 71.69, 93.88, 164.75, 195.01.

2q 1-(N-Etilendiamino)-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-propanol-2 alınır. Çıxım 63,9% təşkil edir. Rf= 0,15 (elyuent – heksan: izopropil spirti 1:1).

1-Asetilamino-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-asetiloksipropan-2. Yastıdibli kəlbada 1q (0,0047mol) 1-amino-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-propanol-2-nin CCl_4 -də məhlulunun üzərinə 1:3 nisbətində asetilxlorid əlavə edilir və 50⁰-60⁰C temperatur intervalında su hamamında 20 dəqiqə qarışdırılır. Kolbanın ağzı bağlanaraq, bir gün sakit halda saxlanılır. Sonra su hamamında qızdırılmaqla həm CCl_4 , həm də reaksiyaya girməyən asetilxlorid uçurdulur. Qalan qalıq çox özülüdür, distillə edilə bilmir.

^1H NMR spektr. (DMSO-d₆, δ , m.h.): 0,96 (s, 6H, 2 CH_3); 1,98 (s, 6H, 2 CH_3); 2,36 (s, 2H, CH_2); 2,49 (s, 2H, CH_2); 3,59 (m, 2H, NCH_2); 4,15 (d, 2H, OCH_2); 5,11 (s, 1H, =CH); 5,82 (m, 1H, HC-O); 7,50 (s,

2H, NH). ¹³C NMR spektr. (DMSO-d₆, δ, m.h.): 21.56, 27.89, 32.97, 41.94, 43.77, 44.91, 63.76, 69.98, 93.89, 171.01, 171.02, 174.92, 189.99.

1q 1-Asetilamino-3-O-4',4'-dimetiltsikloheksen-1-on-6-asetiloksi – propan-2 alınır. Çıxım 71,9% təşkil edir. R_f= 0,36 (elyuent – heksan: izopropil spirti 1:1).

ƏDƏBİYYAT

1. Sara Jane Rhoads and R. W. Hasbrouck. A kinetic study of C- and O-alkylation of some cyclic β-keto esters. //Tetrahedron. 1966, v. 22, №10, p. 3557.
2. Maria Meciarova, Michal Kiripolsky, Stefan Toma. The sonochemical arylation of active methylene compounds. //Ultrasonics Sonochemistry. 2005, v. 12, p. 401.
3. Hyun-Jung Lee, Myung-Eun Suh and Chong-Ock Lee. Synthesis and Cytotoxicity Evaluation of 2-Amino- and 2-Hydroxy-3-ethoxy- carbonyl-N-Substituted-benzo[f]indole-4,9-dione Derivatives. //Bioorganic Medicinal Chemistry. 2003, v. 11, p. 1511.
4. Antonio Arcadi, Giorgio Cerichelli, Marco Chiarini, Di Giuseppe and Fabio Marinelli. Sequential alkylation/transition metal catalysed annulation reactions of 1,3-dicarbonyl compounds with propargyl bromide. //Tetrahedron Let. 2000, v. 41, p. 9195.
5. N.S.Sadixov, Ş.S.Nəsibov, M.A.Axundova, N.D.Sadixova. Funksional əvəzli altüüzlü heteroetsikllərin β-dikarbonillı birləşmələrin 1,3-dibrompropanol 1-2 ilə alkilləşdirilməsi reaksiyası əsasında sintezi. //Bakı Universitetinin xəbərləri. 2004, № 2, s. 57.
6. F.N.Nağıyev, A.M.Məhərrəmov, İ.Q.Mamedov, A.V.Qurbanov, M.Ə.Allahverdiyev. Asetilaseton ilə 1,2-epoksi-3-xlorpropanın reaksiyası. //Kimya Problemləri Jurnalı. 2006, №1, s. 99.
7. Thierry Ollevier and Guillaume Lavie-Compin. An efficient method for the ring-opening of epoxides with aromatic amines catalyzed by bismuth trichloride. //Tetrahedron Letters. 2002, v. 43, p. 7891.
8. Jie Wu and Hong-Guang Xia. Tertiary amines as highly efficient catalysis in the ring-opening reactions of epoxides with amines or thiols in H₂O:expeditious approach to β-amino alcohols and β-aminothioethers. //Green Chemistry. 2005, v. 7, p. 708.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АМИНОВ К ПРОДУКТУ О-АЛКИЛИРОВАНИЯ 5,5-ДИМЕТИЛГЕКСАНДИОНА-1,3 И 1,2-ЭПОКСИ-3-ХЛОПРОПАНА

А.М.МАГЕРРАМОВ, Ф.Н.НАГИЕВ, И.Г.МАМЕДОВ, Н.М.АЛЛАХВЕРДИЕВ,
И.А.АЛИЕВ, М.А.АЛЛАХВЕРДИЕВ

РЕЗЮМЕ

Представлены результаты реакций продукта О-алкилирования димедона (в системе K₂CO₃-ДМСО) эпихлоргидрином с некоторыми аминами. Получены соответствующие аминоспирты-1-(N-2'-метилфениламино)-3-О-(4',4'-диметилциклогексен-1-он-6-пропанол-2, 1-(N-4'-бромфен-иламино)-3-О-(4',4'-диметилциклогексен-1-он-6-пропанол-2, 1-дибутил-амино-3-О-(4',4'-диметилциклогексен-1-он-6-пропанол-2, 1-амино-3-О-(4', 4'-диметилциклогексен-1-он-6-пропанол-2, 1-метиламино-3-О-(4',4'-диметилциклогексен-1-он-6-пропанол-2, 1-(N-этилендиамино)-3-О-(4',4'-диметилциклогексен-1-он-6-пропанол - 2 и 1-ацетиламино-3-О-(4',4'-диметилциклогексен-1-он-6-ацетилоксипропан-2.

**INVESTIGATION TRANSFORMATION REACTIONS OF O-ALKYLATION
PRODUCT OF 5,5-DIMETHYLHEKSANDION-1,3
BY 1,2-EPOXY-3-CHLOROPROPANE WITH SOME**

**A.M.MAGERRAMOV, F.N.NAGIYEV, I.G.MAMEDOV, N.M.ALLAKHVERDIYEV,
I.A.ALIYEV, M.A.ALLAKHVERDIYEV**

SUMMARY

It has been investigated the transformation reactions of O-alkylation product of dione done by epichlorohydrine in the presence system K_2CO_3 -DMSO with some amines and synthesized corresponding aminoalcohols- 1-(N-2'-methylphenylamino)-3-O-(4',4'-dimethylcykloheksen-1-on-6-propanol-2, 1-(N-4'-bromphenylamino)-3-O-(4',4'-dimethylcykloheksen-1-on-6-propanol-2, 1-dibuthylamino-3-O-(4',4'-dimethylcykloheksen-1-on-6-propanol-2, 1-amino-3-O-(4',4'-dimethylcykloheksen-1-on-6-propanol-2, 1-methylamino-3-O-(4',4'-dimethylcykloheksen-1-on-6-propanol-2, 1-(N-ethylendiamino)-3-O-(4',4'-dimethylcykloheksen-1-on-6-propanol-2 and 1-asetylamino-3-O-(4',4'-dimethylcykloheksen-1-on-6-asethyloxypropan-2.