

**MELİORASIYA OLUNMUŞ TORPAQLARIN GEOEKOLOJİ  
DİAQNOSTİKASI VƏ MÜNBITLİYİNİN  
ARTIRILMASI YOLLARI****N.K.MİKAYİLOV, M.Ə.ZEYNALOVA**  
**Bakı Dövlət Universiteti**

*Məqalə meliorasiya olunmuş torpaqların meliorasiyadan əvvəl və sonra onun fiziki, su-fiziki və fiziki-kimyəvi xassələrinin dəyişməsi nəticəsində münbitlik modellərinin yaradılması və ekoloji parametrlərin tapılması yollarına həsr edilmişdir.*

Müasir dövrdə əhalinin zəruri kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin olunması torpaq ehtiyatlarının müasir vəziyyəti, meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılması və səmərəli istifadə edilməsi ilə sıx əlaqədardır. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarılığının artırılması ilə bərabər, torpaq münbitliyinin qorunub saxlanması da vacib və təxirəsalınmaz ekoloji vəzifə hesab olunur.

Torpaqların müxtəlif qeyri-kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə edilməsi aqromeliorativ və aqroekoloji tədbirlərə əməl edilməməsi, eroziya proseslərinin inkişafı, təkrar şoranlaşma, təkrar bataqlaşma, digər deqredasiya proseslərinə uğraması və s. əkin sahələrinin tədricən azalmasına səbəb olur.

Tədqiqat obyektı – iki coğrafi mövqeyə malik olan meliorasiya olunmuş torpaqlarda seçilmişdir. Birinci-tədqiqat obyektı Qarabağ düzündə kompleks meliorativ tədbirlərin ağır gilli şoran torpaqların su-fiziki xassələrinə təsiri cədvəldən (1) göründüyü kimi, meliorasiyadan əvvəl torpaqda sıxlıq – 1,43-1,52 g/sm<sup>3</sup>, xüsusi çəki 2,67-2,77 g/sm<sup>3</sup>, ümumi məsaməlik 42,4-46,4% olmuşdur. Meliorasiya və Fimomeliorativ mənimsəmədən sonra isə bu göstəricilər dəyişərək, sıxlıq 1,25-1,39 və 1,24-1,38 q/sm<sup>3</sup>, xüsusi çəki 2,73-2,78 q/sm<sup>3</sup> və məsaməlik isə 44,1-55,4% arasında dəyişmişdir.

Tədqiqatlar göstərir ki, belə torpaqları gəc, zəif konsentrasiyalı (0,5-1,5%) sulfat turşusu, xlor turşusu, üzvi-mineral turşulaşdırıcı, gəclə peyinin qarışığı və s. yuduqda torpağın mikroaqrekat tərkibi yaxşılaşır, suyadavamlı aqrekatların miqdarı çoxalır, disperslik əmsalı aşağı düşür. Belə bir geoekoloji şəraitdə torpaqların susuzdırma qabiliyyəti yaxşılaşır və nəticədə torpaq zərərli duzlardan təmizlənir (C.M.Hüseynov, 1942; M.R.Abduev, 1959; 1972; 1978; K.H.Teymurov 1964; R.H.Məmmədov, 1989; V.A.Əhmədov, 1972; M.P.Babayev, 1984; N.K.Mikayılov, 1972, 1980, 2003; Y.C. Həsənov 1990, 1993 və b.).

Torpağın əsas fiziki xassələrindən biri olan suya davamlı aqrekatlar >0,25 mm-dən böyük hissəciklərin miqdarı meliorasiyadan əvvəl

18,7-31,8%, meliorasiyadan sonra isə 25,6-32,6: arasında dəyişmişdir. Su-fiziki xassələrdən su tutumunun miqdarı da dəyişərək, meliorasiyadan əvvəl 24,0-35,7%, meliorasiyadan sonra isə dəyişərək 37,5-43,3% təşkil edir.

**Cədvəl 1**

Qarabağ düzündə kompleks meliorativ tədbirlərdən sonra ağır gilli şoran torpaqların su-fiziki xassələrinin dəyişməsi

Təcrübənin sxemi	Dərinalıq sm-lə	q/sm <sup>3</sup>		Ümumi məsaməlik %	Suya davamlı aqreqat. >0,25 mm%	Su tutumu	1 saatda hopan suyun miqdarı mm-lə
		Həcm çəki	Xüsusi çəki				
Meliorasiyadan əvvəl	0-25	1,43	2,67	46,4	18,7	32,8	38-40
	25-50	1,50	2,77	45,8	17,4	24,0	
	50-100	1,52	2,71	42,4	31,8	35,7	
Meliorasiyadan sonra	0-25	1,25	2,74	51,3	26,4	40,3	95-98
	25-50	1,27	2,76	53,9	32,6	43,4	
	50-100	1,39	2,73	44,1	25,6	37,5	
Mənim-səmədən sonra	0-25	1,24	2,78	55,4	33,4	45,7	105-110
	25-50	1,28	2,76	53,1	25,7	40,1	
	50-100	1,38	2,75	44,8	33,0	36,7	

Hazırda torpaqların münbitlik və məhsuldarlıq modellərinin yaradılması, həmçinin ekoloji parametrlərinin tapılması və onların həlledicilərinin müəyyən edilməsi müxtəlif istiqəmətlərdə və fərqli konsepsiyalar əsasında aparılır.

Torpaqların genetik-istehsalat xüsusiyyətlərindən, münbitliyin aparıcı amillərindən, kənd təsərrüfatı bitkilərinin tələbatından, o cümlədən tədqiqatın məqsədindən asılı olaraq münbitlik amilləri müxtəlif bloklarda qruplaşdırılır. Münbitliyin model şəklində verilməsi sistemin qarşılıqlı əlaqədə olan əsas elementlərini müəyyən edir, onu və idarəetmə məsələsini sadələşdirir. Bu baxımdan aqroekoloji modellərin praktiki istifadəsi daha məqsədəuyğundur. Bu modellər bir-birilə əlaqədə olan, münbitliyin əsas amillərini əks etdirən bloklardan (ekoloji torpaq rejimləri, torpaq xassələri, aqro və ekomeliorativ və s.) təşkil olunur. Amillərin bloklar üzrə qruplaşdırılması tədqiqatçının məqsəd və metodundan, ərazinin torpaq-iqlim şəraitindən, bitki örtüyündən asılıdır (Q.S.Məmmədov, A.B.Cəfərov, 1998; N.K.Mikayilov, 2003; S.Z.Məmmədova, 2005 və b.).

Mövcüd ədəbiyyat materiallarının təhlili göstərir ki, Qarabağ düzündə torpaqların müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri (əsasən pambıq və dənli bitkilər) altında geniş istifadəsinə, çoxlu torpaq tədqiqat materiallarının nəticələrinin olmasına baxmayaraq, ərazidə torpaq münbitliyi sistemli şəkildə öyrənilməmişdir.

Aqroekoloji tədqiqatlar sahəsində bir çox nəzəri və praktiki məsələlərin həll olunmasında torpaqların aqrofiziki xassələrinin müəyyən edilməsinin və bu sahədə aparılmış tədqiqatların, ümumiləşdirilməsinin çox böyük nəzəri və təcrübə əhəmiyyəti vardır. Qarabağ düzündə meliorasiyası olunmuş suvarılan çəmən-boz torpaqlarının, əsas aqrofiziki xassələri də göstərilmişdir (cədvəl 2).

Cədvəl 2

Qarabağ düzündə meliorasiya olunmuş torpaqların su-fiziki xassələrinə görə münbitlik səviyyəsi (0-100 sm)

Göstəricilər	Münbitlik səviyyəsi								
	Ağcabədi			Bərdə			Yevlax		
	yüksək	orta	aşağı	yüksək	orta	aşağı	yüksək	orta	aşağı
Həcm çəki q/sm <sup>3</sup>	1,23-1,36	1,37-1,41	1,44-1,46	1,24-1,38	1,26-1,42	1,34-1,46	1,26-1,28	1,30-1,32	1,32-1,36
Xüsusi çəki q/sm <sup>3</sup>	2,69-2,66	2,67-2,68	2,68-2,72	2,70-2,72	2,72-2,76	2,72-2,74	2,72-2,74	2,74-2,76	2,74-2,76
Məsəməlik, %	46,7-47,9	47,0-48,0	46,9-48,2	50,0-52,0	48,0-50,0	46,0-48,0	48,0-50,0	46,0-48,0	44,0-46,0
Suyadavamlı aqre-qatlar >0,25 mm,%	36-38	32-34	28-30	42-44	40-42	36-38	40-42	38-40	34-36
Fiziki gil <0,01 mm,%	40-50	50-70	70-80	48-53	54-56	60-70	50-54	54-56	56-65
zil<0,001 mm,%	8-12	10-20	15-30	16-30	20-30	30-40	14-16	16-18	18-20
Tam su tutumu %	30-35	28-30	26-28	34-36	32-34	36-40	32-34	30-32	28-30
Tarla su tutumu, %	26-28	24-26	22-24	32-34	30-32	32-34	30-32	32-34	34-36
Su hopdurma (6 saat ərzində) mm/dəq.	0,6-0,8	0,5-0,6	0,2-0,4	0,8-0,9	0,6-0,8	0,4-0,6	0,9	0,8	0,6
Solma nəmliyi, %	12-14	10-12	8-10	16-18	12-16	16-18	12-14	10-12	8-10
Məhsuldar su,%	14-16	12-14	10-12	18-20	14-18	20-22	16-18	14-16	12-14
Maksimal hiqroskopik nəmlik, %	10-12	8-10	12-14	14-16	16-18	18-20	12-14	16-18	14-18
Maksimal molekulyar nəmlik, %	18-20	16-18	20-22	18-20	14-16	16-18	14-16	12-14	16-18
Məhsuldarlıq (pambıq) sentner / ha	22-24	12-14	6-8	26-28	16-18	10-12	25-26	15-16	11-13

Torpağın məsəməliliyinin, su, duz, qida elementlərini və humus ehtiyatlarını, şümləmə zamanı torpağın xüsusi müqavimətini hesablaşmaq, həmçinin meliorant, gübrə və yuma, o cümlədən suvarma normalarını müəyyən etmək üçün həcm çəkisinin təyin edilməsi zəruridir.

Həcm, çəki torpağın mexaniki tərkibindən, üzvi maddələrin miqdarından, struktur quruluşundan asılıdır, torpağın aşağı qatlarına doğru getdikdə artır. Onun dəyişməsi torpağın məsəməliliyinin, qaz və hava mübadiləsinin, su keçirməsinin kəmiyyət və keyfiyyətə dəyişməsinə səbəb olur.

Tədqiqat aparılan ərazinin torpaqlarının üzvi maddələrlə zəif təmin olunması, udulmuş kationların orta səviyyədə olması, aqrotexniki tədbirlərə tam əməl olunmaması və s. həcmi kütlənin optimal səviyyədə olmamasına səbəb olan amillərdəndir.

Məsəməlik torpağın əsas fiziki xassələrindəndir, su, hava xassəsini qiymətləndirir və torpaqda gedən fiziki, kimyəvi, bioloji proseslər üçün əlverişli və ya qeyri-əlverişli şərait yaradır. Tədqiqat aparılan təcrübə sahələri torpaqlarının 0-100 m qatında məsəməlik 46-48% arasında gəyişir.

Struktur – torpağın əsas xassələrindən olub, torpaqda gedən bütün proseslər (fiziki, kimyəvi, bioloji) və münbitliyin səviyyəsi ondan asılıdır.

Tədqiq olunan ərazinin suvarılan çəmən boz torpaqları suadavamlı aqre-qatların miqdarına görə zəif və orta qiymətləndirilir. Belə ki, stasionar təcrübə sahələrinə uyğun olaraq, münbitlik səviyyəsinə görə suadavamlı aqre-qatların qiymətləri müvafiq olaraq 35-38; 28-30; 38-40% arasında gəyişir.

Fiziki gil (<0,01mm) torpaqları mexaniki tərkibinə görə təsnifata ayırmaq üçün istifadə edilən əsas göstəricilərdən biridir, onun ayrı-ayrı xassələrinin və münbitliyinin müəyyən edilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Təcrübə sahələrinin münbitlik səviyyəsinə uyğun olaraq lil hissəciklərinin miqdarı 2 saylı cədvəldə verilmişdir.

Torpaq münbitliyinin səviyyəsinin tərtib edilməsi tədqiqat obyektində geoekoloji diaqnostikasının, profilaktiki torpaq qoruyucu tədbirlərin vaxtaşırı yerinə yetirilməsinə və proqnozlaşdırılmasına, onlardan optimal istifadə olunmasına, ekomeiorativ kompleks tədbirlərinin məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsi kimi digər məsələlərin elmi və praktiki əsaslarının işlənilməsinə imkan yaradır.

#### **ƏDƏBİYYAT**

1. Абдуев М.Р. Почвы с делювиальной формой засоления и вопросы их мелиорации. Изд-во АН Азерб.ССР, Баку, 1968. 272 с.
2. Əhmədov V.A. Qarabağ düzü ağır gilli şoranların yuyulmasının torpaqların su-fiziki xassələrinə təsiri. Elmlər namizədi avtoreferatı. Bakı, 1972. 25 s.
3. Волобуев В.Р. Генетические формы засоления почв Кура-Араксинской низменности. Баку. 1965. Изд. АН Азерб. ССР. 215 с.
4. Həsənov Y.C. Kür-Araz ovalığında torpaqların aqrofiziki xassələri və onların məhsuldarlıq qabiliyyəti. Bakı. Elm, 2005. 235 s.
5. Мамедов Г.Ш. Экологическая оценка почв Азербайджана. Баку, 1998, Элм, 234 с.
6. Мамедов Р.Г. Агрофизические свойства и режим почв Азерб. ССР и пути их регулирования. Автореферат докт.диссерт. Баку. 1969. 64 с.
7. Микайлов Н.К. Геоэкологические основы засоления и мелиорации почв Кура-Аразской низменности. Автореф. докт. диссерт. Баку, 2003. 46 с.

#### **ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ПОЧВ**

**Н.К.МИКАЙЛОВ, М.А.ЗЕЙНАЛОВА**

#### **РЕЗЮМЕ**

В статье рассматриваются вопросы геоэкологической диагностики мелиорированных сероземно луговых почв в целях повышения их плодородия.

#### **GEO-ECOLOGICAL DIAQNOSTICS AND THE WAY OF INCREASINQ PRODUCTIVITY OF IRRIQATED SOILS**

**N.K.MIKAILOV, M.A.ZEINALOVA**

#### **SUMMARY**

The questions of geo-ecological diaqnostics of irrigated grey-steppe lawn soils and in-creasing of their productivity are written in this article.