

**ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ KİMYƏVİ MADDƏLƏRLƏ MÜXTƏLİF  
DƏRƏCƏDƏ ÇİRKƏNİŞ TORPAQLARDA ƏKİLƏN AT PAXLASI  
(VİCİA FABA) BİTKİSİNİN MORFOLOJİ  
ƏLAMƏTLƏRİNİN TƏDQIQI**

**A.O.MƏMMƏDOVA**  
***Bakı Dövlət Universiteti***

*İşdə Abşeron şəraitində eyni regionda kimyəvi maddələrlə çirklənmə dərəcəsinə görə fərqlənən torpaqlarda əkilən at paxlası (V.faba) bitkisinin fenotipik əlamətlərinin dəyişməsi səviyyəsi tədqiq edilmişdir. Tədqiqatın nəticələri bitkilərdə flüktua asimetriya göstəricilərinin analizinin ətraf mühitin monitorinqində effektiv test olmasını sübut etdi.*

Dövrümüzün əsas prioriteti davamlı inkişafın təmin edilməsi prinsipidir ki, bu ancaq ekoloji təhlükəsizlik şəraitində mümkündür.(1) Bu problemin həllində bioindikatorlar və onların əsasında həyata keçirilən təbii ətraf mühitin monitorinqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ətraf mühitdə baş verən istənilən proseslərin idarə edilməsi zamanı öncə həmin mühitin keyfiyyəti qiymətləndirilməlidir.(2) Belə proseslərin daimi monitorinqi müxtəlif prinsip və metodlarla həyata keçirilir. Ətraf mühitin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan metodlardan biri də biomonitorinqdir ki, onun üstünlüyü öyrənilən mühitdə ekoloji amillərin kompleks təsirinin tədqiqinə imkan verir. Bu çox vacib məsələdir, belə ki, real həyatda bioloji növlərə heç bir zaman bir mənfi ekoloji amil təsir göstərə bilməz ki, bunu kimyəvi və fiziki metodlarla analiz etmək mümkün olsun. Məlumdur ki, mühitdə bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olan amillər vardır, bu da sinergetik və antoqonist effekt üzə çıxarır, hüceyrə daxili proseslərin metabolik aktivləşməsinə təsir edə bilər. Bu nöqtəyi nəzərdən biomonitorinqin əhəmiyyəti daha da artır. Qədim mənbələrdə olan məlumatlarda Azərbaycanda yaradılmış qədim və orta əsr əlyazmaları və onlarda ətraf mühitin qorunmasına aid məlumatlarda bu göstərilən metod insanlar tərəfindən müşahidə yolu ilə istifadə edilirdi.(3)

Biomonitorinqin daha effektiv yollarından biri çirklənmə dərəcəsi müxtəlif olan mühitlərdə mürəkkəb texniki vasitələrdən istifadə etmədən, hər bir tədqiqatçının həmin mühitdə indikator kimi əkilən bitkilər üzərində müşahidələrin aparılmasıdır.

Hal-hazırkı işdə ətraf mühitin vəziyyətinin indikatoru kimi bəzi bitkilərdən istifadə edərək müşahidələr aparılmışdır. Bu məqsədlə kimyəvi maddələrlə çirklənmə dərəcəsi müxtəlif olan torpaqlarda əkilən bitkilərin ontogenez dövründə öyrənilən əlamətlərin fenotipik dəyişməsinin səviyyəsi müəyyən edilmişdir.

## MATERIAL VƏ METODİKA

Tədqiqat obyektini kimi *Vicia faba* – At paxlasından istifadə edilmişdir. *V.faba* birillik ot bitkisidir. Gövdəsi dik qalxan və 10-100 sm. ölçüdə, yarpaqları yumurtaşəkilli, ucu üç bucaqlı iti, ölçüsü 20-30 mm. Tədqiqat sahələrində əkilmiş toxumdan inkişafın 18-22 günlərində bitkilər 18-25 sm. hündürlükdə olmuşlar.

Tədqiqat sahəsi Abşeronun Görədil kəndində dənizdən 900 m kənardə götürülmüşdür. 10 h-lıq sahənin sotlarla müxtəlif hissələrində meyvə ağacları, tərəvəz və gül əkilmişdir.

Meyvə ağacları və gül əkilən sahələrin torpaqlarından nümunələr götürülərək Ekologiya və Təbii sərvətlər Nazirliyinin Bakı şəhəri Ətraf Mühitin Monitorinqi departamentində müvafiq laboratoriyada kimyəvi analizi aparılmışdır. Analizin nəticələrinə (cədvəl) əsasən müəyyənləşdirilmişdir ki, meyvə ağacları və gül əkilən sahələrdə torpağın xassələri və kimyəvi tərkibi bir qədər fərqlidir.

Torpağın tərkibinin analiz olunduğu sahələrdə at paxlasının toxumları 4 gün disstillə suyunda isladıldıqdan sonra torpağa əkilmişdir. Torpağın tərkibinin analizinə əsasən meyvə ağacları əkilən sahəni nisbətən optimal (kontrol), gül əkilən sahəni ekoloji çirklə hesab etmişik.

Hər iki sahədə 100 toxum əkilmişdir. Əkinin 18-ci günündən başlayaraq hər bitkinin 3 cüt tam formalaşmış yarpaqları müşahidə edilmişdir.

Fenotipik dəyişkənliyin göstəricisi olan flüktuə asimmetriyasının qiyməti yarpaqlarda orta damarlanmadan maksimal enin sağ və sol tərəfinin bilateral fərqi ilə xarakterizə olunmuşdur. Analiz zamanı hər yarpağın bilateral fərqi MBS – 9 lupası ilə ölçülmüşdür.(4) Alınan nəticələr statistik riyazi məlum üsullara kompyüterdə hesablanmış (5) və nəticələr cədvəldə verilmişdir.

## TƏDQIQATIN NƏTİCƏLƏRİ VƏ MÜZAKİRƏ

Tədqiqat işində məqsəd eyni atmosfer havası, eyni iqlim şəraitində sulfatlar, nitratlar, xlor üzvi pestisidlər və herbisidlərlə bir qədər fərqli dərəcədə çirklənmiş torpaqlarda eyni bitki növü əkilərək mühitin indikatoru rolunu oynadığını tam məsuliyyəti ilə müəyyənləşdirmək idi. Biz uzun illər ərzində tədqiqatlar (6;7;8) ekoloji cəhətdən kompleks amillərlə müxtəlif şəkildə çirklənmiş sahələrdə (torpaq, hava, iqlim və s.) inkişaf etmiş bitkilər üzərində müşahidələr edərək apardıq. Hazırkı, tədqiqatla əlaqədar müşahidələr isə bir regionda – Görədil kəndində aparılmışdır. Təcrübə sahələrində fərq, ancaq müşahidə edilən bitkilərin əkiləndiyi torpağın kimyəvi tərkibi və kimyəvi maddələrlə çirklənmə dərəcə-sindəki müxtəliflik olmuşdur. Cədvəldən görüldüyü kimi optimal (kontrol) hesab edilən sahədə torpağın kimyəvi xassələri və tərkibi çirklə hesab etdiyimiz sahədən fərqlidir. (Cədvəl) Belə ki, meyvə ağacları əkilən sahədə PH-7,8, humus 1,6% olmuşdur. Torpağın tərkibində isə sulfatlar, nitratlar, xlor üzvi pestisidlər və herbisidlər kontrol adlandırdığımız meyvə ağacları əkilən sahədə miqdarca (mq/κq) güllər əkilən, nisbətən ekoloji çirklə adlandırdığımız sahədən az olmuşdur. Kontrol adlandırılmış sahədə 100 əkilmiş toxumun 90%-i, çirklə sahədə 89%-i cücərmişdir. Ekoloji çirklə sahədə əkilən bitkilərin yarpaqlarında bilateral fərqi orta qiyməti  $1,12 \pm 0,05$  olmuşdur. Bu kontrol variantdan 1,4 dəfəyə qədər yüksəkdir və artım 38%-i təşkil edir. Flüktuə asimmetriyasının digər göstəricisi olan dispersiya da II variantda 1,4 dəfə artmışdır və artım 40% təşkil edir.

**Abşeron yarımadasının Görədil kəndində kimyəvi tərkibi müxtəlif olan torpaqlarda əkilən at paxlası  
(Vicia faba) bitkisinin yarpaqlarında flüktuə asimetriya göstəricilərinin qiyməti**

Variant	Sahə	Torpağın rəngi, tipi, relyefi	Torpağın xassələri		Torpağın tərkibi mq/kq		Xlor üzvi Pestisidlər	Herbisidlər	Əkilmiş toxumların sayı	Cücürmüş toxumlar	Analiz olunan yarpaqların sayı	Bilateral asimetriya	Dispersiya
			PH	Humus %	Sulfatlar	Nitratlar							
I	Ekoloji təmiz	Boz qonur düzənlik	7,8	1,6	140	36	0,03	0,001	100	90	470	0,81± 0,05	0,79
II	Ekoloji çirкли	Boz qonur düzənlik	7,2	1,1	180	47	0,07	0,002	100	83	410	1,12± 0,05	1,11

Qeyd edik ki, kontrol bitkilərlə müqayisə edilən bitkilər arasında bilateral əlamətlərin dəyişməsindən başqa digər morfoloji dəyişikliklər də nəzərə çarpmışdır. Bu dəyişikliklərə bitkilərin hündürlüyü, yarpaqların ölçüsü daxildir. Kontrol variant bitkilərin yarpaqları müqayisə edilən bitkilərin yarpaqlarına nisbətən iri ölçüdə olmasına baxmayaraq, bilateral fərqi qiyməti kiçik olmuşdur. Kimyəvi maddələrlə daha çox çirklənmiş torpaqlarda əkilən bitkilərin yarpaqları müqayisə edilən variantla nisbətən xırda olmasına baxmayaraq, yarpaqlarda bilateral fərq və əlamətin variabelliği yüksək olmuşdur.

Beləliklə, aparılan tədqiqatın nəticələri göstərmişdir ki, bilateral əlamətlərin dəyişməsinin qiyməti ətraf mühitin keyfiyyətinin testi kimi xarakterizə oluna bilər. Bu metodun üstünlüyü onu çirklənmiş ətraf mühitin vəziyyətinin monitorinqində istifadə etməyə imkan verir. İqtisadi cəhətdən əlverişli və mürəkkəb olmayan bu metodun orta və ali təhsil müəssisələrinin tədris sistemində öyrənilməsi tövsiyyə oluna bilər.

#### ƏDƏBİYYAT

1. Agenda 21: Program of action for sustainable development (Rio Declaration) UN Rublication. New York, 1992.
2. Мамедова А.О. Биоиндикация экологического состояние воздушного бассейна в урбанизированных зонах. «İnsan və biosfer» (MAB) Azərb: Milli Komitəsinin əsərləri, Bakı, Elm, 2004, bur. 4, səh. 155-159.
3. Alakbarli F. Medicol manuscripts of Azerbaijan. Heydar Aliyev Foundation, Bakı, 2006, 246 p.
4. Алекперов У.К. Гашимова У.Ф., Мамедова А.О. Антимутагенная модификация aberrаций хромосом и флюктуирующей асимметрии, Доклады РАН, 1992, Т 325.
5. Лакин Г.Ф. Биометрия, 1978.
6. Мəmmədova А.О. Ligustrum Japonicum Thunb. bitkisinə ekoloji amillərin təsiri. Azərb. MEA-nın Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, XXV c., Elm, 2004, səh. 238-241.
7. Мəmmədova А.О. Ekoloji çirklə şəraitdə bitkilərin morfoloji əlamətlərinin dəyişməsi АМЕА-nın Botanika İnstitutunun elmi işləri, Elm, 2006, XXVI c, səh.153-155.
8. Мəmmədova А.О. Abşeron şəraitində atmosfer çirklənməsinin Olea europea L. bitkisinə təsiri. BDU «Xəbərlər», № 1; 2007, səh. 75-80.

#### ИССЛЕДОВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ КОНСКОГО БОБА (VICIA FABA), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ПОЧВАХ АБШЕРОНА, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

А.О.МАМЕДОВА

#### РЕЗЮМЕ

В настоящей работе исследовано изменение феноминических признаков конского боба (*Vicia faba*), произрастающего в регионе, где условия различались как по химическому составу, так и по уровню загрязнений химическими веществами почвы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что анализ показателей флюктуирующей асимметрии у растений является эффективным тестом для мониторинга состояния окружающей среды.

**INVESTIGATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF Vicia FABA, GROWTH IN SOIL OF APSHERON POLLUTING  
BY DIFFERENT CHEMICAL COMPOUNDS**

**A.O.MAMMADOVA**

**SUMMARY**

In the present paper the phenotypical changes of *Vicia faba* growth in the region where the conditions were different on chemical composition and level of pollution of soil by chemical compounds have been studied. Results of research testify that the analysis of exponents of fluctuation asymmetry of plants is the effective test for monitoring of condition of surrounding environment.