

**MÜXTƏLİF BUĞDA SORTLARININ BƏZİ KEYFİYYƏT
GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ AZOT GÜBRƏSİNİN TƏSİRİ**

M.F.COHƏRİ PİRƏİVATLOU*, **N.A.QASIMOV****, **S.İ.MUSTAFAYEV****
***İran İslam Respublikası, **Bakı Dövlət Universiteti**
yashar77@rambler.ru

Azot gübrəsinin müxtəlif miqdarda və əmsallarda, buğda bitkisinin bəzi keyfiyyət göstəricilərinə təsiri öyrənilmişdir.

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, bezostaya sortunun öyrənilən keyfiyyət xassələrinə görə, nəvid sortuna nisbətən üstünlüyü vardır. Həmçinin hər iki sortda torpağa verilən azot gübrəsinin çoxalması ilə bərabər, dənin keyfiyyət xassələri də çoxalır və ən yüksək keyfiyyət xassələri, azotun 2/3 hissəsinin buğdanın kəlləmə mərhələsində, 1/3 hissəsinin isə çiçəkləmə mərhələsində istifadəsi zamanı əldə edilir.

Buğda bitkisi (*Triticum vulgare* L.) dünyanın əksər qitələrində və geniş ərazilərində əkilməklə, insanların, quşların, heyvanların qidalanmasında və həmçinin sənayedə istifadə olunur (4). Hazırda insanların yarıdan çoxunun zülal ehtiyacları, taxıllardan və digər dənli bitkilərdən hasil olur. Bu nöqtəyi-nəzərdən buğdanın keyfiyyət göstəriciləri bir mühüm faktor kimi buğda bitkisinin seleksiyasında nəzərdə tutulur (1-4). Zülal, qlütelin, dən bərkliyi, unun suçəkmə qabiliyyəti və digər valorimetrik qiymətləri, buğda keyfiyyətinin mühüm göstəricilərindən hesab edilir.

Məlumdur ki, buğda sortlarının keyfiyyət göstəriciləri həm onların genetik xassələrindən, həm də onları əhatə edən xarici mühit amillərdən və qida maddələrindən asılıdır (2, 5). Qasimov (2008) göstərir ki, yaşıl bitkilərin ən mühüm funksiyalarından olan fotosintez və mineral maddələrin metabolizmi bir-birilə sıx əlaqədə olan proseslərdir və bu proseslərin normal gedişi üçün bitki orqanizmi makro və mikro elementlərlə tam təmin olunmalıdır. Makro elementlərdən, azot başqa kimyəvi elementlərlə müqayisədə, bitkilərin həyat fəaliyyətində xüsusi yer tutur. Azota hüceyrə qılıfında, hüceyrə daxili orqanoidlərin, zülal, amin turşuların, xlorofilin, enzimlərin, alkaloidlərin, fitohormonların və s.-nin tərkibində rast gəlinir. Azot fotosintetik aparatın normal formalaşması ilə əlaqədar vegetasiya dövrünün uzanmasına, böyümə və inkişafın stimullaşmasına, bitkinin təbii rəngə malik olmasına və nəhayət, məhsuldarlığın artmasına və dənin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olur. Buğda bitkisi azot çatışmadıqda zülalların sintezi və bəzi keyfiyyət xassələrinin aşağı düşməsi müşahidə edilir. Zebras və həmkarları (1992) göstəriblər ki, azot elementinin istifadəsilə əlaqədar, dən zülal %-i, qlütelin %-i və dən bərkliyi artır. Əlbəttə, azotun hansı miqdarda və mərhələdə, buğda əkilən ərazilərə verilməsi də, buğda bitkisinin keyfiyyət göstəricilərinə müxtəlif cür təsir edə bilər. Lotfollahi və həmkar-

ları (1997) müxtəlif miqdarda və mərhələlərdə azot gübrəsinin təsiri zaman payızlıq buğdalarının bəzi keyfiyyət göstəricilərini öyrənərək göstərdilər ki, torpağa verilən azotun miqdarını çoxaldıqda buğdanın zülalları, dən bərkliyi və valorimetrik qiyməti də çoxalır. Bu zaman ən yüksək keyfiyyət göstəriciləri bitkiyə azotun çiçəkləmə mərhələsində verildikdə əmələ gəlir. Nəhayət, azotun münasib səviyyədə istifadəsi, bitkinin məhsuldarlığını və keyfiyyət göstəricilərini yüksəltməkdən əlavə, torpağın qatlarında, nitrat ionunun (NO_3^-) çoxalmamasına səbəb olur ki, bu da torpağın, bitkinin zəhərlənməsinə və ümumiyyətlə, ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olur (4,7).

Tədqiqatın obyektləri və metodları

Tədqiqat işi əkin sahəsi formasında üç təkrardan ibarət aparılıb.

Nəvid və Bezostaya sortları birinci (ardıcıl A_1 və A_2) ilk faktor və xalis azot elementi (60-90-140 kq/ha) (ardıcıl B_1 , B_2 , B_3) ikinci faktor və hər miqdarın müxtəlif əsaslarda istifadəsi (yəni, C_1^1 , C_2^2 , C_3^3 və C_4^4) üçüncü faktor seçilib.

Əkin işi 20 noyabrda, hər kvadrat metrə 400 toxum nəzərə alaraq, əkin sahələri formasında aparılıb. Hər sahədə 10 xətt, 20 sm məsafə ilə 6 metr uzunluqda əkilib. Bütün sahələr eyni şəraitdə becərilmiş və sonda laboratoriyada, Beynəlxalq taxıl elmləri və texnologiyalarının protokolu (3) əsasında, dən zülal%, qlütenli%, dən bərkliyi, unun suçəkmə qabiliyyəti və valorimetrik qiymətlər müəyyənləşdirilib (müxtəlif buğdalardan alınmış xəmirlərin keyfiyyət xassələrini yoxlamaq üçün, laboratoriyada farinoqraf cihazının vasitəsilə xəmirlərin yetişkənlik müddətini, stabilliyini, davamlılığını, elastikliyi, axma dərəcəsini və s. müəyyənləşdirib, ümumi halda valorimetrik qiymət adlandırılıb). Bu qiymət 1-100-ə qədər qruplaşdırılıb.

Tədqiqatın nəticələri

Tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, (cədvəl 1, şəkil 1) bezostaya sortunun, zülal və qlütenin miqdarı nəvid sortuna nisbət çoxdur. Bu da onun genetik potensialından, yaxud onun azot mənimsənilmə qüvvəsindən və ya azotdaşıma qabiliyyətindən asılıdır (7).

Həmçinin bezostaya sortunda zülal miqdarının çox olması dənləri də bərkidir. Digər tədqiqatçılar da (2-8) göstəriblər ki, ümumiyyətlə, zülalları çox olan sortların dənləri də bərk olur. Bu da N_2 molekulunun bitkilərdə toplanmasından və sonra C/N (karbon-azot) nisbətindən dəyişməsindən asılıdır. Hər iki sortun unlarının suçəkmə qabiliyyətinin müqayisəsi göstərdi ki; bezostaya sortu çoxlu miqdarda zülal, qlüten və dən bərkliyinə malik olduğundan onun ununun suçəkmə qabiliyyəti də çoxdur. Çünki zülal fermentlərində belə bir xassə vardır ki, onlar öz çəkirlərinin 200%-ə qədər miqdarında su çəkməyə qabildirlər.


¹ $C_1=2/3$ kollar+ $1/3$ gövdə.

² $C_2=2/3$ kollar+ $1/3$ çiçəkləmə.

³ $C_3=2/3$ gövdə+ $1/3$ çiçəkləmə.


⁴ $C_4=1/3$ kollar+ $1/3$ gövdə+ $1/3$ çiçəkləmə.

| Cədvəl -1: | | keyfiyyət göstəricilərinin orta hesab rəqəmləri | | | | |
|---------------------------------|--|---|---------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Eksperimentin tərkib hissələri: | | zulal% | qlüten% | unun suçəkmə qabiliyyəti | dən-bərkliyi | valorimetri qiyməti |
| sort: | Nəvid | 9,74 b | 21,72a | 63,16b | 48,19b | 39,28b |
| | Bezostaya | 10,03a | 22,83a | 65,54a | 61,64a | 50,56a |
| Azot(κq/hek) | 60 | 9,01b | 19,00b | 63,78b | 53,54c | 44,08a |
| | 90 | 9,32ab | 21,46b | 64,25b | 54,83b | 44,29a |
| | 140 | 10,43a | 26,38a | 65,03a | 56,38a | 46,38a |
| Əmsallar: | C1 | 9,68a | 22,22a | 63,06b | 53,67b | 44,78a |
| | C2 | 9,55a | 21,89a | 64,26ab | 54,72ab | 44,94a |
| | C3 | 10,09a | 23,56a | 65,62a | 55,89a | 45,93a |
| | C4 | 9,61a | 22,44a | 64,48a | 55,39a | 44,61a |
| İzahat: | bütün amillərin orta hesab rəqəmləri ayrıldıqca Dunkən usulu ilə 5% xəta ehtimalı ilə müəyyənleşdi | | | | | |
| | hər sütunda müştərək hərfləri olan xarakterlərin fərqi | | | | | |
| | C1=2/3 kollanma +1/3 Gövdə | | | | | |
| | C2=2/3 kollanma +1/3 çiçəkləmə | | | | | |
| | C3= 2/3 Gövdə +1/3 çiçəkləmə | | | | | |
| | C4=1/3 kollanma +1/3 Gövdə +1/3 çiçəkləmə | | | | | |




Şəx. 1. Sortların keyfiyyət göstəricilərinin müqayisəsi.

Nəhayət, bezostaya sortu 50/56 valorimetrik qiymətilə, yaxşı keyfiyyətlər qrupunda və nəvid sortu isə 39/28 qiymətlə zəif keyfiyyətlər qrupunda yerləşirlər. Tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, hər iki sortda azot miqdarının çoxalması ilə bərabər, zülal və qlüten % və dən bərkliyi, unun su çəkmə qabiliyyəti və valorimetri qiymətinin çoxalmasına səbəb olur (cədvəl 1, şəkil 2) və ən yüksək keyfiyyət göstəriciləri azotun yuxarı səviyyədə (140 kq/ha) istifadəsi zamanı hasil olur. Çünki azot, zülalların və amin turşularının quruluşunda iştirak edir və bitki tərəfindən mənimsənilməsi keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşmasına səbəb olur. Azotun müxtəlif dərəcədə istifadəsi göstərir ki, (cədvəl 1, şəkil 3) ən yüksək zülal, qlüten, unun su çəkmə qabiliyyəti, dən bərkliyi və valorimetrik qiyməti, azotun 2/3 hissəsinin kollanma mərhələsində və 1/3 hissəsi isə bitkilərin çiçəkləmə mərhələsində istifadə etdikdə meydana çıxır. Yəni alınan nəticələrə istinad edərək, demək olar ki, buğdanın inkişafının son dövründə azotun istifadəsi keyfiyyət göstəricilərinin çoxalmasına səbəb olur, çünki buğdanın inkişafının son dövrlərində azotun çatışmazlığı nitratreduktaz fermentinin aktivliyini zəiflədir, bu da öz növbəsində zülalların sintezini zəiflədir. Lakin C₃ əmsalı bu nöqsanı aradan qaldırır və keyfiyyət göstəricilərinin çoxalmasına səbəb olur. Həmçinin aparılan tədqiqatlarda valorimetrik qiymət ilə bütün keyfiyyət göstəricilərinin, müsbət korrelyasiyası nəzərə çarpır, bu da valorimetrik metoddan buğda bitkisinin seleksiyasında bir münasib ölçü kimi istifadə etməyə imkan verir.



Şək. 2. Müxtəlif azot miqdarının keyfiyyət göstəricilərinə təsiri.



Şək. 3. Müxtəlif azot əmsallarının keyfiyyət göstəricilərinə təsiri.

ƏDƏBİYYAT

1. Anderson W.K., Ymiur M.S., Dantuono M.F. Evidence for difference between cultivars in responsiveness of wheat to applied nitrogen. *Aust // Agric.Res.* 1991, №42, p.363-377.
2. Hamer R.J., Weegels P.I., Marseille J.P. Prediction of the bread making quality of wheat: The use of HMW glutenin-A subunit-based quality scoring system // *Cereal Sci.* 1992, №15, p.91-102.
3. International Association for Cereal Chemistry Newsletter.1944, №26-27, p. 314-320.
4. Lotfollahi M., Alsom A.M., McDonald G.K. Effect of nitrogen fertilizer placement on grain protein concentration of wheat under different water regimes. *Aust // Agric Res.* 1997, №48, p.241-250.
5. Pilbeam C.J., Mcneill A.M., Harris H.C., Swift R.S. Effect of fertilizer rate and form on the recovery of N-15 labelled fertilizer applied to wheat in Syria // *Agric.Sci. (Cambridge).* 1997, №128, p.415-424.
6. Qasimov N.A. Bitki fiziologiyasi. Bakı: Bakı Universiteti, 2008, 484 s.
7. Saradon S.J., Gianibelli M.C. Effect of foliar urea spraying and nitrogen application at sowing upon dry matter and nitrogen distribution in wheat // *Agronomie.* 1990, №10, p.183-189.
8. Zebarth, B.J., Sheard R.W. Influence of rate and timing of nitrogen fertilization on yield and quality of hard red winter wheat in Ontario. *Can. // Plant Sci.* 1992, №72, p.13-19.

**ДЕЙСТВИЕ АЗОТИСТЫХ УДОБРЕНИЙ НА НЕКОТОРЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ**

М.Ф.ДЖОХАРИ ПИРЕИВАТЛОУ, Н.А.КАСУМОВ, С.И.МУСТАФАЕВ

РЕЗЮМЕ

Изучено влияние различных количеств азотных удобрений на некоторые качественные показатели пшеницы. Результаты экспериментов показали, что сорт пшеницы «Безостая» по сравнению с сортом пшеницы «Навид» обладает более высокими качественными показателями. В то же время, с внесением в почву азотных удобрений, наблюдалось улучшение качественных характеристик зерна обоих сортов пшеницы, и наилучшее качество семян достигалось при внесении в почву 2/3 азотных удобрений в период кущения и 1/3 части удобрений в период цветения пшеницы.

**EFFECTS OF NITROGEN ON QUALITY CHARACTERISTICS OF
DIFFERENT SORTS OF WHEAT**

M.F.JOHARI PIREIVATLOU, N.A.QASIMOV, S.I.MUSTAFAYEV

SUMMARY

This experiment was conducted in 2007 to evaluate the effect of different amount of nitrogen and its split application on quality characteristics of wheat cultivars, at Mogan condition in Iran. The results of experiment show, that bezostaya with higher protein and wet gluten percentage, seed hardness, water absorption and finally valorimetry value was superior to novid sort. Increasing nitrogen application caused the increase of quality characteristics of the seeds of both sorts. The highest quality characteristics are obtained by using 2/3 of nitrogen at stem extension stage and 1/3 at blooming stage.